Revista Ibérica de Aracnología, nº **38** (30/06/2021): 36–51.
Grupo Ibérico de Aracnología (S.E.A.). ISSN: 1576 - 9518.

ARAÑAS (ARANEAE) DE LA CIUDAD DE ELCHE Y SUS PEDANÍAS (ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, ESPAÑA)

Jesús Hernández-Corral[1] & José A. Barrientos[2]

[1] Instituto de Investigación CIBIO. Universidad de Alicante, 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, España. jesus.hdez3@gmail.com
[2] C/ Balmes, 181. 08006, Barcelona (España). joseantonio.barrientos@uab.es

Resumen: Se presenta el resultado de los muestreos realizados durante las dos últimas décadas en el término municipal de Elche (Alicante, España). Se han analizado 2478 especímenes, entre los que están representadas 140 especies distribuidas entre 114 géneros y 33 familias. Se describe una especie nueva, *Cryptachaea amilcari* Barrientos & Hernández-Corral **sp. n.** Se aporta la primera cita de varios taxones para distintos ámbitos geográficos: una especie para España; dos familias, 16 géneros y 36 especies para la Comunidad Valenciana; una familia, 22 géneros y 34 especies para la provincia de Alicante.
Palabras clave: Araneae, taxonomía, especie nueva, faunística, primeras citas, Península Ibérica, Alicante.

Spiders (Araneae) from the city of Elche and its rural districts (Alicante, Comunidad Valenciana, Spain)
Abstract: The paper presents the results of the sampling carried out during the last two decades in the municipality of Elche (Alicante, Spain). 2478 specimens have been studied, including 140 species belonging to 114 genera and 33 families. A new species is described, *Cryptachaea amilcari* Barrientos & Hernández-Corral **sp. n.** The first records of several taxa for various geographical areas are provided: 1 species for Spain; 2 families, 16 genera and 36 species for the Comunidad Valenciana administrative region; 1 family, 22 genera and 34 species for Alicante province.
Key words: Araneae, taxonomy, new species, faunistics, first records, Iberian Peninsula, Alicante.

Taxonomia / Taxonomy: *Cryptachaea amilcari* **sp. n.**

Introducción

El conocimiento faunístico de las arañas en la Península Ibérica se ha incrementado de manera considerable en los últimos años. No obstante, la información disponible es asimétrica existiendo amplias zonas carentes de datos o con datos muy escasos.

En la actualidad, la información sobre las arañas con presencia en la Península Ibérica viene compilada en forma de checklist incluyendo datos sobre las provincias en las que han sido citadas y cuáles son consideradas endémicas (Cardoso & Morano, 2010; Branco *et al*., 2019). La reciente publicación de un catálogo sobre la diversidad de arañas de la provincia de Alicante (Muñoz-Maciá, 2019) y la puesta en marcha de una nueva versión del Catálogo Ibérico (De Biurrun *et al*., 2019) de este grupo de artrópodos, han supuesto un salto cuantitativo importante en el conocimiento faunístico de la provincia Alicante. A dicha información pueden añadirse los datos de una reseña posterior sobre las arañas de Nueva Tabarca (Hernández-Corral & Barrientos, 2020).

El resultado de la consulta del catálogo de Muñoz-Maciá (2019) y del Catálogo Ibérico (De Biurrun *et al*., 2019) arroja un balance de 59 publicaciones a considerar. La mayor parte de ellas solo mencionan una especie de la provincia de Alicante (Bacelar, 1933; Denis, 1935, 1962; Machado, 1939; Wiehle, 1962; Blanke, 1972; Senglet, 1972, 2001; Wunderlich, 1980, 1995a, 1995b, 1995c; Ribera, 1981a, 1981b, 1983; Platnick & Murphy, 1984; Blasco, 1986; Ferrández, 1986; Wesolovska, 1986; Barrientos & Ribera, 1988; Kraus & Kraus, 1988; Hormiga & Ribera, 1990; Thaler & Knoflack, 1998; Urones, 2004; Ferrández & Alberdi, 2005; Ferrández & Beamonte, 2005; Moradmand & Jäger, 2012; Ferrández & Carrillo, 2013; Melic, 2014; Carrillo & Ferrández, 2014; Ribera & De Más, 2015; Hernández-Corral & Ferrández, 2015; Carrillo *et al*., 2016; Bosmans *et al*., 2017; Marmaneu *et al*., 2017; Muñoz *et al*., 2017; Rezac *et al*., 2018; Henriques *et al*., 2018; Bellvert *et al*., 2018; Tanasevitch, 2019); o bien dos (Thorell, 1875b; Bosmans, 2008; Senglet, 2012; Bolzern *et al*., 2013; Bosmans *et al*., 2018, 2019); o de tres a diez especies (Thorell, 1875a; Simon, 1907; Reimoser, 1919; Fage, 1931; Machado, 1942; Zaragoza & Sendra, 1988; Bosmans, 1994; Bosmans & Van Keer, 1999; Ribera, 2004; Senglet, 2011); únicamente el catálogo de Fernández-Galiano (1910), el trabajo de Ortuño *et al*. (2013), el de Logunov (2015), dedicado a los Salticidae, el de Hernández-Corral & Barrientos (2020), sobre la isla de Tabarca y el propio catálogo de Muñoz-Maciá (2019) pasan de diez especies citadas de esa provincia.

Esta penuria informativa contrasta con el interés que despierta desde un punto de vista faunístico, el Sureste peninsular; y al mismo tiempo pone en valor el esfuerzo realizado por Muñoz-Maciá (2019) que sitúa las cifras en 36 familias, 116 géneros y 170 especies. No obstante, como el mismo autor reconoce, son cifras demasiado cortas que justifican nuevos esfuerzos para aproximar los datos disponibles a las cifras reales que debe tener la fauna de arañas en la provincia alicantina.

El crecimiento de la ciudad de Elche y su expansión en zonas residenciales periféricas, han ido transformando el ambiente natural, de modo que la fauna se ha visto relegada a las zonas menos degradadas o se ha ido adaptando a las nuevas condiciones impuestas por la actividad humana.

En este marco de trabajo, los principales objetivos del presente estudio son: 1) aumentar el conocimiento de la araneofauna presente en el municipio de Elche; 2) ampliar el catálogo de especies de arañas en la provincia de Alicante; 3) incrementar el número de taxones de arañas concurrentes en la Comunidad Valenciana y en España.




Fig. 1. Mapa del tèrmino municipal de Elche con sus pedanías en la provincia de Alicante (Comunidad Valenciana, España), con indicación de aquellas de dónde proceden las muestras estudiadas.
Fig. 1. Map of the municipal area of Elche with its districts in the province of Alicante (Valencian Community, Spain), with an indication of those from which the studied samples come from.

Materiales y métodos

Área de estudio

La provincia de Alicante es la más pequeña y meridional de las tres que constituyen la Comunidad Valenciana (Fig. 1); cuenta con una superficie total de 5816 km^2. La ciudad de Elche se encuentra en la gran llanura aluvial, al sur del Sistema Bético cuya parte más oriental separa Valencia de Alicante. Cuenta con un extenso territorio de 327,33 Km^2 repartido en 30 pedanías o partidas rurales.

Su clima es de tipo mediterráneo, con veranos largos, calurosos y muy secos (las máximas pueden alcanzar los 40ºC); en cambio, los inviernos suelen ser cortos y con temperaturas suaves, rara vez inferiores a los 3ºC de mínima. Las precipitaciones son muy escasas, casi siempre en forma de lluvia, y se concentran en primavera y otoño.

La vegetación habitual, en consonancia con el clima, es el llamado bosque mediterráneo, caracterizado por una vegetación de hoja perenne y xerófila, adaptada a la sequía del largo período estival. La especie climácica y dominante es la carrasca, si bien la más abundante es el pino carrasco. El sotobosque dominante está compuesto por especies leñosas de tipo espinoso y aromático (como el romero, el tomillo, la coscoja, el lentisco, el mirto, el hinojo, la aliaga o la jara).

Muestreos e identificación de las especies

Las arañas estudiadas fueron colectadas por el primer autor entre los años 2000 y 2020, de forma manual y esporádica, en varias pedanías del municipio de Elche (Alicante). La pedanía de Arenales del Sol se encuentra en el mapa incluida en la de Balsares (Fig. 1). A ellas se han añadido algunas capturas recientes mediante el uso de trampas de caída, pero no obedecen a un protocolo regular preestablecido. Las arañas se individualizaron en viales y se fijaron en etanol al 70%, quedando cada una acompañada del etiquetado de localización correspondiente. Las muestras se encuentran depositadas en la colección particular del primer autor (a excepción del material tipo de *Cryptachaea amilcari* **n. sp.** depositado en el MNCN de Madrid).

Las coordenadas de las distintas pedanías se obtuvieron a través de Google Earth (*datum* WGS84), expresadas en grados con un nivel de precisión de 100 metros en la mayoría de los puntos (a excepción de Elche-ciudad, que es de 1 km). La altitud se encuentra expresada en msnm (ver Tabla I).

Tabla I. Coordenadas y altitud de las pedanías muestreadas en el término municipal de Elche. Las coordenadas (Lat/Long) han sido tomadas de Google Earth. / **Table I**: Coordinates and altitude of the sampled areas in the municipality of Elche. The coordinates (Lat/Long) have been taken from Google Earth.

Pedanía	Coordenada	Altitud
Elche-ciudad	38.26ºN, 0.69ºW	83
Elche (Maitino)	38.274ºN, 0.614ºW	59
Elche (Ferriol)	38.307ºN, 0.722ºW	158
Elche (Torrellano)	38.286ºN, 0.601ºW	67
Elche (Matola)	38.230ºN, 0.746ºW	40
Elche (Daimés)	38.213ºN, 0.698ºW	24
Elche (La Marina)	38.144ºN, 0.646ºW	29
Elche (Las Bayas)	38.227ºN, 0.641ºW	24
Elche (El Altet)	38.271ºN, 0.547ºW	16
Elche (La Hoya)	38.211ºN, 0.682ºW	21
Elche (Arenales del Sol)	38.238ºN, 0.517ºW	3

El análisis taxonómico se ha realizado de una manera combinada, en el gabinete personal de José A. Barrientos (la mayor parte, en Barcelona) y en el laboratorio del CIBIO en la Universidad de Alicante, siguiendo las pautas generales: observación y manipulación con microscopía óptica (lupa binocular) y el auxilio de la bibliografía general pertinente (Simon, 1914-1937; Locket & Millidge, 1951-1953; Locket *et al.*, 1974; Roberts, 1985-87, 1995, 1987; Nentwig *et al*., 2021). En algunos casos, nos hemos auxiliado con otra bibliografía, cuyas referencias se detallan a lo largo del texto. Acompañando a la descripción de la nueva especie, se han realizado dibujos de la facies general y de su genitalia; para ello se ha empleado un retículo ocular cuadriculado que permite la traslación de las imágenes al papel; las figuras se han sombreado en función de su relieve y grado de pigmentación. Las medidas vienen expresadas en mm.

En los aspectos relativos a la Nomenclatura, nos hemos ceñido al World Spider Catalog (2021).

Resultados y discusión

a) Resultados globales

Se han estudiado un total de 2478 ejemplares (510♂♂, 780♀♀ y 1188 jj), distribuidos entre 140 especies nominales (no se contabilizan las que están solamente bajo el apelativo genérico: *Zora* sp., *Trabea* sp., *Tibellus* sp. y *Lasaeola* sp.), pertenecientes a 33 familias y 114 géneros (ver Anexos A y B). Cotejando nuestros datos con los obtenidos en el análisis bibliográfico previo sobre la fauna de arañas alicantinas, se

añaden al listado tres familias (Anyphaenidae, Miturgidae y Segestriidae; todas ellas familias menores), 38 géneros y 72 especies (incluida la nueva especie, que se describe en este trabajo). De las anteriores, son primera cita para la Comunidad Valenciana 2 familias (Anyphaenidae y Miturgidae), 16 géneros y 36 especies. Con ello, incluyendo aquí los datos recientemente publicados sobre la Isla de Tabarca (Hernández-Corral & Barrientos, 2020), la fauna alicantina de arañas estaría formada (de momento) por 249 especies pertenecientes a 160 géneros integrados en 39 familias. Sin duda una cifra todavía inferior a la que debe existir realmente.

b) *Cryptachaea amilcari* sp. n. (Theridiidae)
(Fig. 2-8)

MATERIAL TIPO. HOLOTIPO: 1♀, Elche (ciudad, Hort de Baix), 21-X-2017, depositado en el MNCN de Madrid con el número MNCN 20.02/19854. PARATIPO: 1♀, misma referencia que el holotipo, depositado en el MNCN de Madrid con el número MNCN 20.02/19855.

DIAGNOSIS. *C. amilcari* se reconoce por su opistosoma, algo más alto que largo y coronado por un pequeña punta aguda; la facies pigmentaria dorsal del mismo presenta un dibujo foliolado, que puede quedar desdibujado. En cambio el escudo prosómico, de color claro, presenta una mancha negra, de lados paralelos, que se extiende desde los ojos hasta la fóvea, donde se estrecha en punta; los márgenes laterales están remarcados por una línea negra. El epigino está formado por una placa triangular, esclerosada y erguida, que destaca en una vista lateral.

ETIMOLOGÍA. La especie está dedicada Amilcar Barca (270 A.C.-228 A.C.), general y estadista cartaginés artífice de la conquista de Hispania, que supuestamente murió en la ciudad de Elche.

DISTRIBUCIÓN. Los datos disponibles se limitan a la ciudad de Elche (fig. 2).

DESCRIPCIÓN (Hembra Holotipo).
Caracteres somáticos (figs. 3, 4, 7 y 8). Longitud total 2,36. Escudo prosómico: 0,84 de largo por 0,72 de ancho. Con un color de fondo blanco amarillento, interrumpido por un patrón negro grisáceo de este modo: una banda marginal estrecha y muy próxima al borde, algo irregular; una mancha negra que arranca de la zona ocular negro-grisácea, que se extiende hacia atrás con los bordes paralelos hasta alcanzar las proximidades de la fóvea, a la que llega estrechándose en punta aguda. Fóvea bien marcada, en depresión trasnversal. Ojos bien desarrollados en disposición regular (dos líneas) y areolados de negro (L2 recta; distancia MP-MP > su diámetro; LA y LP muy próximos; sólo separados por la areola). Quelíceros pequeños, de 0,36 de largo. Patas blanco amarillentas, con una mácula anular distal en la tibia (especialmente visible en la pata IV; medidas: pata I (1,48+0,24+0,84+1,04+0,48), pata II (1,00+0,22+0,38+0,44+0,44), pata III (0,64+0,20 +0,32+0,40+0,36), pata IV (1,12+0,22+0,60+0,80+0,44). Están recubiertas de una fina pilosidad y carecen de espinas. I>IV>II>III. Esternón (0,60 de largo, por 0,84 de ancho) salpicado de pequeñas máculas negro-grisáceas. Pieza labial corta (0,12) y ancha (0,16). Opistosoma 1,52 de largo por 1,24 de ancho, con predominio del eje dorso-ventral (altura: 1,94) en cuya parte superior presenta un pequeño tibérculo. Es de color blanco grisáceo, con un patrón pigmentario en su cara dorsal consistente en varias máculas oscuras irregulares (figs. 4 y 7) y tres líneas transversales depigmentadas (especialmente visibles lateralmente (fig. 3). Está recubierto de una fina pilosidad esparcida por todo el tegumento poco apreciable. Aspecto ventral (fig. 8)

Epigino (figs. 5 y 6). En vista lateral, el epigino sobresale en la cara ventral del epigastro en forma de punta aguda, perpendicular a la superficie (fig. 3). Visto ventralmente, dicha punta tiene forma triangular (fig. 6), su punta es aguda y su base forma la pared anterior de una foseta poco marcada, a cuyos lados se incian los conductos de fecundación. No hay otras estucturas externas. Los conductos internos son muy cortos y acceden de inmediato a las espermatecas, visibles por trasparencia a ambos lados, un poco por detrás del saliente triangular externo (fig. 6).

DISCUSIÓN Y AFINIDADES. *C. amilcari* es una forma afín a *C. riparia* (Blackwall, 1834) de la que difiere claramente, tanto por la forma del epigino (aplanado y de pared anterior corta y redondeada en esta última), como por el patrón pigmentario dorsal, especialmente estable y diferente en el escudo prosómico (anque más variable en el opistosoma).

c) Faunística (Anexo B)
En este sub-apartado los datos de distribución general están tomados de Nentwig *et al.* (2021) y los de distribución iberobalear de De Biurrun *et al*. (2019).

Familia **AGELENIDAE**

Textrix caudata L. Koch, 1872. Aunque en la banda mediterránea la especie dominante del grupo Textricini es *Lycosoides coarctata* (Dufour, 1831), también pueden encontrarse otras especies comunes, como es el caso de *T. caudata* muy extendida por toda la Península ibérica. Se cita ahora por primera vez para la provincia de Alicante; y con ella al género *Textrix* Sundevall, 1833.

Familia **ANYPHAENIDAE**

Anyphaena alboirrorata Simon, 1878 y *Anyphaena sabina* L. Koch, 1866. Se cita por primera vez de la Comunidad Valenciana a la familia Anyphaenidae Bertkau, 1878 y con ello al género *Anyphaena* Sundevall, 1833 y a las dos especies (*A. alboirrorata* y *A. sabina*) aquí estudiadas. Las especies ibéricas, bien caracterizadas en Urones *et al*. (1995), colonizan, de un modo u otro, los estratos inferiores de la vegetación (herbáceo y arbustivo) sin que por el momento seamos capaces de delimitar los nichos ecológicos de ninguna de ellas.

Familia **ARANEIDAE**

Larinia lineata (Lucas, 1846). Aunque con algunas reservas, hemos asignado un ejemplar inmaduro a esta especie, por tratarse de la única del género *Larinia* Simon, 1874 citada de la Península Ibérica. Sería la primera cita de género y especie en la provincia de Alicante.


Zygiella x-notata (Clerck, 1757). Es una especie común y abundante en toda la Cuenca Mediterránea. Su presencia en Alicante era previsible, si bien en este caso se trata de la primera cita de la especie y el género para la Comunidad Valenciana. Se ha citado en localidades muy dispersas de la Península Ibérica.

Familia **CHEIRACANTHIIDAE**

Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864. Aunque *Cheiracanthium* C. L. Koch, 1839 es un género rico en especies [se han citado hasta 16 en la fauna ibérica (Urones, 1988), tan solo *C. seidlitzi* (Latreille, 1817) se había citado de Alicante (Salinas de Pinoso;



Fig. 2. Hábitat de *Cryptachaea amilcari* **sp. n**., constituido por un bosque de palmeras (*Phoenix dactylifera* L., 1753) en el lugar conocido como “Hort de Baix” (Elche) junto al cauce del rio Vinalopó.
Fig. 2. Habitat of *Cryptachaea amilcari* **sp. n**., constituted by a palm trees forest (*Phoenix dactylifera* L., 1753) in the place known as "Hort de Baix" (Elche), next to the Vinalopó riverbed.






Fig. 3-8. *Cryptachaea amilcari* Barrientos & Hernández-Corral, **sp. n**. **3.** Facies lateral de la hembra holotipo. **4.** Aspecto y facies pigmentaria dorsal de la hembra paratipo. **5.** Epigino, aspecto lateral (holotipo). **6.** Vista ventral del epigino de la hembra holotipo. **7.** Facies latero-dorsal de la hembra paratipo. **8.** Aspecto y facies pigmentaria ventral de la hembra paratipo.
Fig. 3-8. *Cryptachaea amilcari* Barrientos & Hernández-Corral, **sp. n. 3.** Lateral facies of holotype female. **4.** Appearance and dorsal pigmentary facies of the paratype female. **5.** Epigino, lateral aspect (holotype). **6.** Ventral view of the epiginum of the holotype female. Dorso-lateral facies of paratype female. **8.** Appearance and ventral pigmentary facies of the paratype female.

Muñoz-Maciá, 2019)]. Entre nuestras muestras no está representada *C. seidlitzi*, pero sí lo está otra especie citada de puntos muy heterogéneos de la Península Ibérica; *C. mildei* se cita por primera vez en la provincia de Alicante. Los *Cheiracanthium* son comunes en primavera-verano colonizando las partes altas de la vegetación herbáceas en praderas y cultivos de gramíneas. En ellas son especialmente visibles sus "cestas" de protección (Urones, 1988).

Familia **CLUBIONIDAE**

Porrhoclubiona vegeta (Simon, 1918). En la reciente publicación sobre la isla de Tabarca (Hernández-Corral & Barrientos, 2020) se menciona por primera vez para la provincia de Alicante a *P. vegeta*; ahora volvemos a hacerlo en la zona continental. *P. vegeta* parece ser una especie común, en la zona sur-oriental de la Península Ibérica, en ambientes epiedáficos antrópicos. La identificación se apoya en la última revisión de las especies de *Clubiona* Berland, 1947 (Bosmans *et al.*, 2017).

Familia **DICTYNIDAE**

Brigittea civica (Lucas, 1850), *Lathys humilis* (Blackwall, 1855) y *Nigma puella* (Simon, 1870). Solo *Archaeodictyna consecuta* (O. Pickard-Cambridge, 1872) se había citado de la provincia de Alicante con anterioridad. Las tres especies que ahora se mencionan son muy comunes en todo el Área Mediterránea, por lo que su primera mención en esta ocasión apenas merece ser destacada. *B. civica* y *L. humilis* se citan con sus géneros respectivos (*Brigittea* Lehtinen, 1967 y *Lathys* Simon, 1884) por primera vez para toda la Comunidad Valenciana. *N. puella* y el género *Nigma* Lehtinen, 1967 se citan por primera vez para la provincia de Alicante.

Familia **ERESIDAE**

Eresus kollari Rossi, 1846. El género *Eresus* Walckenaer, 1805 es el más extendido en la Península ibérica; sin embargo, no se había citado aún de la provincia de Alicante. La captura de un macho adulto permite asegurar ahora su presencia en la zona estudiada. *E. kollari* es una especie críptica que se protege bajo piedras y forma poblaciones difusas, por lo que las capturas suelen ser escasas.

Familia **GNAPHOSIDAE**

La familia Gnaphosidae es la que presenta un mayor número de novedades faunísticas; hasta trece especies (de las 23 que se han capturado; ver Anexo B) son novedades para la provincia de Alicante y, de ellas ocho no se conocían en la Comunidad Valenciana y una es primera cita para España. Son primera cita para la provincia alicantina los géneros *Drassodes* Westring, 1851, *Micaria* Westring, 1851 y *Nomisia* Dalmas, 1921. *Poecilochroa* Westring, 1874 es primera cita para la Comunidad Valenciana y *Scotophaeus* Simon, 1893 fue citado por primera vez en la isla de Tabarca (Hernández-Corral & Barrientos, 2020).

Drassodes cupreus (Blackwall, 1834), *Drassodes lapidosus* (Walckenaer, 1802) y *Drassodes luteomicans* (Simon, 1878). Los machos de *D. lapidosus* y *D. cupreus* se distinguen bien por la disposición de los tres dientes quelicéricos (1+2, muy separados en *D. lapidosus*; 1, 1, 1, ± equidistantes en *D. cupreus*) mientras que en las hembras el septo medio del epigino se estrecha y alarga por delante de las fosetas en el primero y sobresale poco por delante de ellas, en el segundo. En cambio, en *D. luteomicans* el septo medio del epigino es ancho y corto, con unas fosetas laterales reducidas en las hembras; en los machos los dentículos quelicéricos se presentan agrupados en su extremo distal, cerca del gancho. Aunque con citas muy diseminadas, *D. luteomicans* se ha citado de diversos puntos de la Península Ibérica, a excepción del cuadrante sur-oriental; ésta es su primera cita para la Comunidad Valenciana. Hay pocas citas previas de *D. cupreus*, y en este caso están localizadas en el cuadrante nor-occidental; también ahora se cita por primera vez de la Comunidad Valenciana. Finalmente, *D. lapidosus* es la especie más común y abundante. Se ha citado de numerosos puntos de la Península Ibérica y resulta sorprendente que esta sea su primera mención en la provincia de Alicante.

Haplodrassus securifer Bosmans & Abrous, 2018. Se ha capturado un solo macho de esta especie. Su identificación ha sido posible por comparación con los datos de su descripción en la revisión genérica de Bosmans *et al.* (2018). Es su primera cita en la Comunidad Valenciana.

Micaria dives (Lucas, 1846). El género *Micaria* Westring, 1851 posee un elevado número de especies. De todas las que se han mencionado en la fauna ibérica, quizá *M. dives* es la que resulta más fácil de diagnosticar; ello es posible por su facies pigmentaria característica, reconocible también en las fomas juveniles. Se cita aquí por primera vez el género y la especie de la provincia de Alicante.

Nomisia aussereri (L. Koch, 1872) y *Nomisia exornata* (C.L. Koch, 1839). Las especies del género *Nomisia* Dalmas, 1921 suelen formar poblaciones generosas, por lo que son frecuentes y abundantes en los muestreos epiedáficos. Aunque esta sea la primera cita para la provincia de Alicante del género y ambas especies, creemos que todas [junto con *Nomisia celerrima* (Simon, 1914)] son formas comunes en las proximidades del Mediterráneo.

Poecilochroa senilis (O. P.-Cambridge, 1872) y *Poecilochroa poonaensis* (Tikader, 1982). Las únicas citas ibéricas de *P. poonaensis* son del sur de Portugal, de la zona de Faro (Wunderlich, 2011; 2012; 2017) bajo las denominaciones *Macarophaeus sabulum* Wunderlich, 2011 y *Macarophaeus taborensis* (Levy, 1999); recientemente, en el trabajo de Sankaran *et al* (2020) se ponen en sinonimia de *P. poonaensis*. Solo se ha citado de Portugal, Grecia, Chipre, Israel y la India; es, por ello un hallazgo interesante. Los datos disponibles de *P. senilis* son también escasos, aunque parece estar mucho más extendida por Europa y el Norte de África; también su caracterización es mucho más precisa. Esta especie y el género *Pecilochroa* Westring, 1874 se citan por primera vez de la Comunidad Valenciana.

Scotophaeus blackwalli (Thorell, 1871) y *Scotophaeus validus* (Lucas, 1846). Aportamos la primera cita para la Comunidad Valenciana de estas dos especies. El género *Scotophaeus* Simon, 1893 fue citado en la isla de Tabarca (Hernández-Corral & Barrientos, 2020). *S. blackwalli* es una especie bien caracterizada (Platnick & Shadab, 1977; Roberts, 1995) y distribuida por la zona paleártica occidental. *S. validus* presenta una distribución más restringida y ha sido recientemente recaracterizada por Lissner (2017).

Zelotes flagellans (L. Koch, 1882) y *Zelotes fuscorufus* (Simon, 1878). Estas dos especies del género *Zelotes* Gistel, 1848 son poco conocidas. *Z. flagellans* se conoce exclusivamente de la Península Ibérica e Islas Baleares; la mayor parte de los datos disponibles proceden de muestreos intensivos, por lo que probablemente se trata de una especie epiedáfica bastante críptica. Senglet (2011) ofrece una buena caracterización de ambos sexos. Por el contrario, *Z. fuscorufus* se ha citado de varios países ribereños del Mediterráneo occidental y de sus islas; en la Península Ibérica solo disponemos de un dato previo del centro de España (Urones & Majadas, 2002); Senglet (2004) hace una buena recaracterización de esta especie. Tanto *Z. flagellans* como *Z. fuscorufus* se citan por primera vez de la Comunidad Valenciana. A resaltar la presencia de los endemismos ibéricos *Z. pediculatoides* Senglet, 2011 y *Z. uronesae* Melic, 2014.

Familia **LINYPHIIDAE**

La familia Linyphiidae incluye un gran número de especies diminutas y de actividad epiedáfica y críptica. En la medida en que los muestreos se han ido haciendo más meticulosos y exhaustivos, hemos ido conociendo mejor la diversidad de esta extensa familia de arañas. No es extraño que la información previa de algunos territorios sea especialmente pobre; ni tampoco que una búsqueda más intensa evidencie la presencia de nuevas formas. Así, en nuestro caso, podemos mencionar otras nueve especies como novedades faunísticas para la provincia de Alicante. En general se trata de especies que alcanzan un tamaño muy pequeño.

Canariphantes tenerrimus (Simon, 1929) y *Canariphantes zonatus* (Simon, 1884). Los datos disponibles sitúan ambas especies en los países más occidentales de Europa y en el Norte de África, con una distribución más o menos coincidente; en ambos casos se dispone de localizaciones en el ámbito cavernícola o hipogeo, pero también (de una manera creciente) del estrato más superficieal del suelo rico en restos vegetales. Son especies muy afines; pero, en los machos, la forma de la lamela característica y, en las hembras, la longitud del escapo permite su reconocimiento. Se citan aquí por primera vez para la Comunidad Valenciana junto con el género *Canariphantes* Wunderlich, 1992.

Diplocephalus graecus (O. P.-Cambridge, 1873). Es también una novedad para la Comunidad Valenciana. Localizada según los datos disponibles, en la parte occidental de Europa y del Norte de África, *D. graecus* es posiblemente una especie en expansión que aparece frecuentemente en los muestreos intensivos de la fauna vinculada al suelo.

Erigone dentosa O. P.-Cambridge, 1894. Es una especie originaria de Norteamérica y América Central, que se ha citado recientemente de puntos muy distantes en la Península Ibérica y Europa occidental. Los machos se reconocen fácilmente por la curvatura del dentículo patelar, pero no hay un criterio seguro para distinguir a las hembras. Es también una nueva cita para la Comunidad Valenciana.

Microctenonyx subitaneus (O. P. Cambridge, 1875). Es otra novedad de la especie y el género para la Comunidad Valenciana. En este caso se trata de uno de los linífidos más diminutos. La forma del epigino se reconoce con facilidad, siendo un carácter inequívoco; en el caso de los machos la dificultad es mayor aunque las estructuras del bulbo son también características. Está ampliamente distribuido por Europa, incluida la Península Ibérica e Islas Baleares.

Ostearius melanopygius (O.P.-Cambridge, 1880). Se trata de una especie frecuente en toda Europa, aunque no muy abundante. Se ha citado de distintos puntos de la Península, si bien ésta es su primera cita para la provincia de Alicante y también del género *Ostearius* Hull, 1911. Se reconoce fácilmente por la mancha oscura en su extremo posterior opistosomico, que contrasta con el resto del cuerpo. Posee también una genitalia característica.

Ouedia rufithorax (Simon, 1881). Este pequeño linífido se va conociendo progresivamente de nuevas localidades a medida que se realizan muestreos más precisos de la fauna epiedáfica. *O. rufithorax* se encuentra distribuido por Europa y Norte de África en su parte occidental. Se reconoce bien por su color oscuro, de tonos rojizos, y la estructura de su epigino y bulbo copulador. Esta es la primera cita de la especie y el género en la Comunidad Valenciana.

Pelecopsis bucephala (O. P.-Cambridge, 1875) y *Pelecopsis inedita* (O. P.-Cambridge, 1875). Actualmente se conocen doce especies del género *Pelecopsis* Simon, 1864 en la Península Ibérica; normalmente forma poblaciones abundantes que colonizan la zona de mantillo y hojarasca en el nivel epiedáfico. Los machos suelen presentar una voluminosa protuberancia cefálica, flanqueda de dos fosetas glandulares muy marcadas; también es frecuente que el tegumento sea coriáceo y presente un escudo opistosómico (caso de *P. bucephala*); aunque no siempre (caso de *P. inédita*). Ambas especies parecen ser comunes en la zona de estudio y ambas se citan junto con el género por vez primera en la provincia de Alicante.

Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852). Es una especie vanal, con una distribución muy amplia y repetidamente citada en la Península Ibérica. Se cita por primera vez de la provincia de Alicante.

Familia **LYCOSIDAE**

Arctosa perita (Latreille, 1799). Se ha constatado su presencia por toda la zona Paleártica occidental; es una especie común en toda Europa y en el Norte de África, aunque paradójicamente ésta sea su primera cita para la provincia de Alicante junto con el género *Arctosa* C. L. Koch, 1847.

Hogna ferox (Lucas, 1838) y *Hogna radiata* (Latreille, 1817). *H. radiata* es frecuente en todos los países mediterráneos; su biología ha sido estudiada con cierto detalle por Brady (2012), quien recoge en su trabajo la incertidumbre que despierta su enorme variabilidad. Así, se han puesto en sinonimia unas cuantas especies y se han descrito algunas subespecies; la fauna ibérica podría ser un ejemplo de esta situación, en cuyo catálogo subsisten todavía algunos nombres de posición taxonómica incierta. Paradójicamente sólo la escasez de muestreos explica que ahora se cite por primera vez para la provincia de Alicante, y con ella al género *Hogna* Simon, 1885. Junto a ella, en el tercio meridional de la Península Ibérica, se encuentra una especie afín más común y abundante en el Norte de África: *H. ferox*. Sabemos bastante poco de esta especie de Lucas. Desde un punto de vista taxonómico, Hepner & Paulus (2009) y Lecigne (2012) se han esforzado en poner algo de luz en las posibles diferencias con *H. radiata*; en lo biológico, a la sombra de las dudas que despierta la variabilidad de *H. radiata*, parece subsistir alguna incertidumbre. Son necesarios nuevos estudios sobre estas arañas. *H. ferox* se cita por primera vez en la Comunidad Valenciana.

Pardosa proxima (C.L. Koch, 1847). Es una de las especies más frecuente y abundante del género *Pardosa* C. L. Koch. 1847. Se cita aquí por primera vez para la provincia de Alicante, junto con el género *Pardosa* C. L. Koch, 1847, aunque su presencia en la misma podría haberse dado por segura.

Trabea sp. Se han capturado dos juveniles que corresponden al género *Trabea* Simon, 1876. Lo mencionamos aquí por tratarse de la primera cita del género para la provincia alicantina.

Familia **MITURGIDAE**

Zora sp. Hemos capturado un ejemplar juvenil que se puede asignar claramente al género *Zora* C. L. Koch, 1847; aunque no es posible asignarlo a ningún taxón específico concreto de forma segura, lo mencionamos aquí por representar la primera cita del mismo y de la familia Miturgidae en la Comunidad Valenciana.

Familia **OECOBIIDAE**

Oecobius maculatus Simon, 1870. Junto con *Oecobius navus* Blackwall, 1859, *O. maculatus* se encuentra de modo frecuente y abundante en la zona de estudio; sin embargo, esta última no se había citado aún en la provincia de Alicante. Aunque ambas especies presentan un área de distribución amplia, *O. maculatus* parece ser una especie más meridional y se ha citado práctica-

mente de todos los países del arco mediterráneo. Son formas muy afines en sus caracteres somáticos, por lo que es necesario analizar su genitalia para diferenciarlas.

Familia **OONOPIDAE**

Oonops pulcher Templeton, 1835. En la zona de estudio parece ser abundante otro oonópido, *Silhouettella loricatula* (Roewer, 1942); sin embargo, *O. pulcher* es una especie común de amplia distribución, pero muy poco abundante. Por ello, quizá no se habían citado hasta la fecha en la Comunidad Valenciana tanto la especie como el género *Oonops* Templeton, 1835. La identificación de las especies del género *Oonops* (y, en general, todos los oonópidos) es muy laboriosa, ya que es necesario disponer de machos adultos y analizar bien su bulbo copulador mediante una microscopía adecuada.

Familia **OXYOPIDAE**

Oxyopes mediterraneus Levy, 1999. Se conoce tan solo de seis localidades en la Península Ibérica, aunque están relativamente alejadas. Probablemente es una especie habitual en la mitad sur de la Península Ibérica, compartiendo el hábitat herbáceo con otros *Oxyopes* Latreille, 1804, aparentemente más comunes. A nivel general parece existir una distribución discontinua (España, Grecia, Chipre, Israel, Irán), algo que merecería una atención especial. Esta es su primera cita para la Comunidad Valenciana.

Familia **PHILODROMIDAE**

Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802). Se trata de una especie de distribución holártica, muy común en toda Europa. Se ha citado en muchos puntos de la Península Ibérica e Islas Baleares, pero lo hacemos ahora por primera vez de la provinica de Alicante. Está integrada en el grupo "aureolus" por sus afinidades con otras especies (también comunes) como es *P. aureolus* (Clerck, 1757), citada previamente en la provincia alicantina, que da nombre al grupo.

Pulchellodromus pulchellus (Lucas, 1846). Como la especie anterior, *P. pulchellus* también se cita por primera vez de Alicante, de donde ya se han citado *P. glaucinus* (Simon, 1870) y *P. rufica-pillus* (Simon, 1885). El género *Pulchellodromus* Wunderlich, 2012 forma un conjunto de especies muy homogéneas que se diferencian esencialmente por algunos caracteres de su genitalia.

Rhysodromus histrio (Latreille, 1819). Es la especie más abundante de la familia en la zona de estudio. Como sucede en *Pulchellodromus*, *Rhysodromus* Schick, 1965 está definido por el conjunto de caracteres que constituyen su genitalia. Tanto el género como la especie se citan por primera vez para la Comunidad Valenciana.

Thanatus fabricii (Audouin, 1826), *Thanatus formicinus* (Clerck, 1757) y *Thanatus vulgaris* Simon, 1870. Aunque no es difícil reconocer el género *Thanatus* C. L. Koch, 1837, las especies que lo integran se resisten a una identificación segura (especialmente las hembras). No obstante, entre las muestras estudiadas hemos podido diferenciar estas tres especies; las dos primeras se citan por primera vez en la Comunidad Valenciana y la tercera se hace para la provincia de Alicante.

Familia **PHOLCIDAE**

Holocnemus caudatus (Dufour, 1820). En Benhadi-Marín (2013) se pueden encontrar figuras diferenciales de las tres especies citadas hasta la fecha en la fauna ibérica. Sólo se carecía de datos en la provincia de Alicante de *H. caudatus*.

Familia **SALTICIDAE**

Aelurillus aeruginosus (Simon, 1871). *Aelurillus* Simon, 1884 es un género complejo, representado en la Zona Paleártica por un número considerable de especies que parecen estar restringidas a zonas bien definidas. *A. aeruginosus* se ha citado a lo largo del Mediterráneo, de un extremo al otro, pero no fuera de él. Las muestras de Elche obedecen a su tipología morfológica y representan su primera cita para la provincia alicantina.

Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802). Las especies del género *Ballus* C. L. Koch, 1850 tienen el cuerpo rechoncho y de aspecto coriáceo. Aunque se han citado otras especies del género en la fauna ibérica, *B. chalybeius* parece ser la más común y extendida. Se reconoce bien por su genitalia. Es la primera cita del género y la especie para la provincia de Alicante.

Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) y *Euophrys rufibarbis* (Simon, 1868). *Euophrys* C. L. Koch, 1834 es uno de los géneros más complejos de la familia. De las 107 especies incluidas actualmente en el mismo, 34 se conocen de Europa y de ellas 17 se han citado en el ámbito ibero-balear. Por otro lado, es un género que guarda clara relación con *Pseudeuoprhys* Dahl, 1912 y *Talavera* Peckham & Peckham, 1909. El reconocimiento de las especies que los integran exige una atención especial al patrón pigmentario (prosómico y opistosómico), así como a ciertos detalles de la morfología genital. De las dos especies que ahora mencionamos, los datos constituyen su primera cita para la Comunidad Valenciana.

Leptorchestes mutilloides (Lucas, 1846). Es una de las especies de Salticidae que guardan cierto aspecto de hormiga. Se ha citado en las partes más meridionales de Europa, así como en el norte de África. Esta es la primera cita del género y la especie para la Comunidad Valenciana. Las especies de *Leptorchestes* Thorell, 1870 guardan una gran similitud morfológica.

Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802). Aunque por su aspecto podría confundirse con alguna de las especies del género *Evarcha* Simon, 1902, los machos de *M. nidicolens* poseen un émbolo alargado y curvo; también las estructuras del epigino son características. No se conocía la especie ni el género *Macaroeris* Wunderlich, 1992 de la provincia de Alicante.

Menemerus taeniatus (L. Koch, 1867). Es un saltícido de considerable tamaño que se reconoce bien por su facies pigmentaria. Distribuida por la Zona Mediterránea de Europa Occidental, se ha citado repetidamente de la Península Ibérica e Islas Baleares, si bien esta es su primera cita para la Comunidad Valenciana.

Pseudeuophrys nebrodensis Alicata & Cantarella, 2000. Citamos ahora por primera vez esta especie en la Comunidad Valenciana, pero ya se conocía de diversos puntos de la Península Ibérica. Su distribución parece estar limitada a los países del Mediterráneo Occidental.

Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837). Las especies del género *Salticus* Latreille, 1804 se reconocen bien por algunos caracteres asociados a su genitalia (apófisis tibial en el palpo de los machos; forma del epigino, en las hembras); a ellos se añade la facies pigmentaria, con un patrón semejante, pero con rasgos diferentes en cada caso. *S. zebraneus* se ha citado por toda Europa y Oriente Medio; se cita ahora por primera vez de la provincia de Alicante.

Thyene imperialis (Rossi, 1846). Se reconoce facilmente a *T. imperialis* por su facies pigmentaria y por el perfil de su escudo prosómico; a ello deben añadirse los rasgos de su genitalia, también característica. Aunque se ha citado de diversos puntos de la zona paleártica, se puede considerar una forma esencialmente mediterránea. Esta es la primera cita del género *Thyene* Simon, 1885 y de esta especie para la provincia de Alicante.

Familia **SCYTODIDAE**

Scytodes velutina Heineken & Lowe, 1832. Aunque los datos bibliográficos señalan que se trata de una especie presente en todos los países de la ribera mediterránea, *S. velutina* no se ha citado previamente en la Comunidad Valenciana, ni en Murcia, ni en Cataluña; en cambio sí se ha hecho de distintas islas del Archipiélago Balear. Sus rasgos pigmentarios y la morfología de su genitalia masculina permiten una diagnosis segura. Los datos de Elche indican que se trata de una especie común y abundante. Esta es su primera cita para la Comunidad Valenciana.

Familia **SEGESTRIIDAE**

Segestria pusiola Simon, 1882. Hay algunas citas antigüas de Galicia, Asturias, Portugal, Mallorca y Malaga; a ellas se añade una más reciente de Cádiz (Sánchez & Bosmans, 2017). Se conoce tan solo de España y Argelia. Esta especie se reconoce por la espinulación de sus metatarsos, a la que acompañan otros caracteres más ambigüos, como son el tamaño corporal y la facies pigmentaria dorsal (Nentwig *et al.*, 2020). Se cita aquí por primera vez la familia y el género de la provincia de Alicante mientras que la especie lo es para la Comunidad Valenciana.

Familia **THERIDIIDAE**

Crustulina scabripes Simon, 1881. Este pequeño terídido se encuentra entre los arbustos o a nivel epiedáfico refugiado bajo las piedras. Presenta un esclerosamiento tegumentario considerable y se asemeja a *C. sticta* (O. Pickard-Cambridge, 1861); los rasgos diferenciales más evidentes radican en la presencia de una mancha blanca en el epigastro y la posesión de un dentículo ancho en el proceso principal del émbolo (en los machos). Aunque hay pocos datos (Portugal, Cádiz, Cataluña), probablemente es una especie común en toda la Península; se ha citado de casi todos los Países Mediterráneos; no obstante esta es la primera cita del género *Crustulina* Menge, 1868 y de esta especie en la Comunidad Valenciana.

Dipoena melanogaster (C.L. Koch, 1837), *Platnickina tincta* (Walckenaer, 1802) y *Theridion mystaceum* L. Koch, 1870 son especies comunes con una distribución amplia; las tres se citan por primera vez en la provincia de Alicante y sólo la ausencia de muestreos o su parquedad justifican este hecho. Las tres se encuentran habitualmente en el sotobosque, más o menos vinculadas a los estratos inferiores cercanos al suelo. *D. melanogaster* se reconoce fácilmente por su aspecto coriáceo y su patrón pigmentario. *P. tincta* comparte su hábitat en los países mediterráneos con una especie afín, *Platnickina nigropunctata* (Lucas, 1846), sin que por el momento sepamos cuales son sus diferencias ecológicas; ambas tienen el cuerpo blanquecino y salpicado de pequeñas manchas negras, exisitiendo algunas diferencias en este patrón que hacen posible su reconocimiento. *T. mystaceum* es una especie muy común, bien caracterizada en todos los manuales faunísticos; no obstante se han descrito algunas especies afines con las que podría confundirse (es necesario observar atentamente su genitalia). Los géneros *Dipoena* Thorell, 1869 y *Theridion* Walckenaer, 1805 son primera cita para la provincia de Alicante.

Lasaeola sp. Se ha capturado un ejemplar juvenil que hemos asignado al género *Lasaeola* Simon, 1881; este dato supondría la primera cita del género para la provincia de Alicante.

Ruborridion musivum (Simon, 1873) es un Theridiidae diminuto que se encuentra en todos los países mediterráneos (europeos y norteafricanos); debido a su pequeño tamaño y la escasa pigmentación del cuerpo, puede pasar por una forma inmadura si se descuida la observación de su genitalia. Una buena caracterización precisa que facilita su reconocimiento se puede encontrar en los trabajos de Levy & Amitai (1982), Knoflach *et al*. (2009) y Wunderlich (2011). Esta es la primera cita del género *Ruborridion* Wunderlich, 2011 y de esta especie para la provincia de Alicante.

Sardinidion blackwalli (O. P.-Cambridge, 1871). Ofrecemos ahora la primera cita del género *Sardinidion* Wunderlich, 1995 y de esta especie para la Comunidad Valenciana. Los pocos datos disponibles de la Península Ibérica están considerablemente dispersos (varios puntos de Portugal, Cataluña, Castilla-La Mancha y Andalucía); no obstante es una especie repartida por toda Europa Central y Meridional y citada también del Norte de África. Probablemente esta especie forma poblaciones escasas con algunos requerimientos ecológicos precisos (aprovecha los huecos de las cortezas de los árboles), que ahora desconocemos.

Theridion hanoniae Denis, 1945. Este pequeño *Theridion* Walckenaer, 1805 se encuentra preferentemente en zonas pedregosas aprovechando los huecos umbríos. Aunque está citada de Turquía, los datos la sitúan en los países más occidentales de Europa y del norte de África. Probablemente se encuentra repartida por toda la Península Ibérica (aunque los datos disponibles son todavía escasos). No se había citado hasta la fecha de la Comunidad Valenciana.

Familia **THOMISIDAE**

Bassaniodes bliteus (Simon, 1875). Especie habitual en ambientes epiedáficos. La ambigüedad de sus rasgos morfológicos la han situado en distintos géneros (*Ozyptila* Simon, 1864, *Xysticus* C. L. Koch, 1835 y *Psammitis* Menge, 1876). Se ha citado en toda la Península y en las Islas Baleares. Esta es su primera cita para la provincia de Alicante, además del género *Bassaniodes* Pocock, 1903.

Bassaniodes bufo (Dufour, 1820). Como otras especies del género, *B. bufo* se encuentra frecuentemente en el mantillo de las zonas boscosas y arbustivas, especialmente en la zona mediterránea occidental. Resulta especialmente llamativa la librea pigmentaria de los machos, en la que contrastan las manchas blancas y negras en distintas partes del cuerpo; por el contrario, las hembras (más voluminosas) presentan un patrón pigmentario mucho más críptico. Se cita aquí por primera vez de la provincia de Alicante.

Misumena vatia (Clerck, 1757). *M. vatia* es una especie florícola con una amplia distribución; resulta paradójico que esta sea su primera cita para la Comunidad Valenciana al igual que el género *Misumena* Latreille, 1804.

Xysticus nubilus Simon, 1875. Se trata de una especie típicamente mediterránea, extendida especialmente por la mitad sur peninsular. Se encuentra también en las Baleares. Esta es su primera cita para la provincia de Alicante.

Familia **ULOBORIDAE**

Uloborus plumipes Lucas, 1846. Aunque mucho menos citada que *Uloborus walckenaerius* Latreille, 1806, *U. plumipes* se encuentra extendida por toda la Península Ibérica; también está presente en las Islas Baleares. Parece ser una especie frecuente, en especial en la ribera del Mediterráneo; sin embargo sólo hay una cita de la Comunidad Valenciana. Ésta sería su primera mención en la provincia de Alicante.

Agradecimiento

Agradecer los comentarios y sugerencias del editor (Antonio Melic) que contribuyeron en la mejora del manuscrito.

Bibliografía

BACELAR, A. 1933. Araignées theraphoses nouvelles ou peu connues de la fauna iberique. *Bulletin da Sociedade Portuguesa de Sciencias Naturais*, **11**: 285-290.

BARRIENTOS, J.A. & C. RIBERA 1988. Algunas reflexiones sobre las especies del grupo «atrica», en la Península Ibérica (Araneae, Agelenidae, *Tegenaria*). *Revue Arachnologique*, **7**: 141-162.

BELLVERT, A., M. DOMÉNECH, P. CABRERA-CÁNOVES & J. PUJALDE-VILLAR 2018. First record of *Erigone autumnalis* Emerton, 1882 (Araneae: Linyphiidae: Erigoninae) for the Iberian Peninsula. *Revista Ibérica de Aracnología*, **33**: 73-74.*

BENHADI-MARÍN, J., J. A. BARRIENTOS, M. Á. FERRÁNDEZ, S. HENRIQUES & E. MORANO 2013. Second annotated list of selected spider families (Arachnida: Araneae) held at the University of León (Spain). *Revista Ibérica de Aracnología* **22**: 71-78.*

BLANKE, R. 1972. Untersuchungen zur Okophysiologie und Oketologie von *Cyrtophora citricola* Forskoel (Araneae: Araneidae) in Andalusien. *Forma et Functio*, **5**: 126-206.

BLASCO, A. 1986. Consideraciones taxonómicas sobre las especies ibéricas del género *Ambliocarenum walckenaeri* (Lucas, 1846). *Boletim da Sociedade Portuguesa de Entomología*, **supl. 1**: 507-516.

BOLZERN, A., D. BURCKHARDT & A. HÄNGGI 2013. Phylogeny and taxonomy of European funnel-web spiders of the *Tegenaria-Malthonica* complex (Araneae: Agelenidae) based upon morphological and molecular data. *Zoological Journal of the Linnean Society*, **168**: 723-848.

BOSMANS, R. 1994. Revision of the genus *Zodarion* Walckenaer 1833 in the Iberian Peninsula and Balearic Islands (Araneae, Zodariidae). *Eos*, **69**: 115-142.

BOSMANS, R. 2008. A new contribution to the knowledge of the genus *Typhochrestus* Simon in Europe and North Africa (Araneae: Linyphiidae). *Revista Ibérica de Aracnología*, **16**: 83-92.*

BOSMANS, R. & J. VAN KEER 1999. The genus *Enoplognatha* Pavesi, 1880 in the Mediterranean region (Araneae: Theridiidae). *Bulletin of the British Arachnological Society*, **11**: 209-241.

BOSMANS, R., A. HENRARD, S. BENHALIMA & O. KHERBOUCHE-ABROUS 2017. The genus *Clubiona* Latreille, 1904 (Araneae: Clubionidae) in the Maghreb, with notes on the *genevensis* group and new records from the Mediterranean Region. *Zootaxa*, **4353** (1): 1-28.

BOSMANS, R., O. KHERBOUCHE-ABROUS, S. BENHALIMA & C. HERVÉ 2018. The genus *Haplodrassus* Chamberlin, 1922 in the Mediterranean and the Maghreb in particular (Araneae: Gnaphosidae). *Zootaxa*, **4451**: 1-67.

BOSMANS, R., P. PANTINI, P. LOVERRE & R. ADDANTE 2019. New species and new records of ant-eating spiders from Mediterranean Europe (Araneae: Zodariidae). *Arachnologische Mitteilungen*, **57**: 8-20.

BRADY, A. R. 2012. Nearctic species of the new genus *Tigrosa* (Araneae: Lycosidae). *Journal of Arachnology*, **40**: 182-208.

BRANCO, V. V., E. MORANO & P. CARDOSO 2019. An update to the Iberian spider checklist (Araneae). *Zootaxa*, **4614**: 201-254. doi: 10.11646/zootaxa.4614.2.1

CARDOSO, P. & E. MORANO 2010. The Iberian spider checklist (Araneae). *Zootaxa*, **2495**: 1-52.

CARRILLO, J. & M. Á. FERRÁNDEZ 2014. Primeros registros de *Scytodes univittata* Simon, 1882 (Araneae: Scytodidae) en la Península Ibérica. *Revista Ibérica de Aracnología*, **24**: 53-57.*

CARRILLO, J., R. RAMOS DA SILVA & M. Á. FERRÁNDEZ 2016. Nuevas citas de *Xysticus grallador* Simon, 1932 (Araneae: Thomisidae) de la Península Ibérica. *Revista Ibérica de Aracnología*, **28**: 129-133.*

DE BIURRUN, G., C. PRIETO & E. BAQUERO 2019. Iberian Spider Catalog. Actualización del mapa web y sus funciones. Arachnomap 2019. Online at: http://sea-entomologia.org/gia/ map [Accessed on: 03/11/2020]

DENIS, J. 1935. A propos de quelques araignées du genre *Zodarion* Walck appartenant á la faune francaise. *Bulletin de la Societé d'Histoire Naturelle de Toulouse*, **67**: 51-68.

DENIS, J. 1962. Quelques araignées d'Espagne centrale et septentrionale et remarques synonimiques. *Bulletin de la Societé d'Histoire Naturelle de Toulouse,* **97**: 276-292.

FAGE, L. 1931. Biospeologica LV. Araneae, 5ª Serie, precedée dun esai sur levolution souterraine et son determinisme. *Archives de Zoologie Expérimentale et Générale*, **71**: 91-291.

FERNÁNDEZ-GALIANO, E. 1910. Datos para el conocimiento de la distribución geográfica de los Arácnidos de España. *Memorias de la Sociedad Española de Historia Natural*, **6**: 343-424.

FERRÁNDEZ, M. Á. 1986. Las especies ibéricas del género *Harpactocrates* Simon, 1914 (Araneida: Dysderidae). *Actas X Congreso Internacional de Aracnología*, **1**: 337-348.

FERRÁNDEZ, M. Á. & J. M. ALBERDI 2005. Nuevas citas de mimétidos ibéricos (Araneae: Mimetidae). *La Tarántula*, **3**: 9-25.

FERRÁNDEZ, M. Á. & J. BEAMONTE 2005. Nuevas citas de arañas de la Península Ibérica. *La Tarántula*, **3**: 67-71.

FERRÁNDEZ, M. Á. & J. CARRILLO 2013. Los Hersilidos ibéricos entre la singularidad y el desconocimiento. *La Tarántula*, **4**: 3-29.

HENRIQUES, S. S., J. MIÑANO, L. PÉREZ-ZARCOS, M. ŘEZÁČ, F. RODRIGUEZ, R. TAMAJÓN & J. MARTÍNEZ-AVILÉS 2018. First records of *Loureedia* (Araneae, Eresidae) from Europe, with the description of a new species and a survey of the genus. *Revista Ibérica de Aracnología*, **33**: 3-20.*

HEPNER, M. & H. F. PAULUS 2009. Contributions on the wolf spider fauna (Araneae, Lycosidae) of Gran Canaria (Spain). *Bulletin of the British Arachnological Society*, **14**: 339-346.

HERNÁNDEZ-CORRAL, J. & M. Á. FERRÁNDEZ 2015. Observaciones sobre las cúspulas labiales y maxilares en *Macrothele calpeiana* (Walckenaer, 1805) (Araneae: Hexathelidae). *Revista Ibérica de Aracnología*, **26**: 63-67.*

HERNÁNDEZ-CORRAL, J. & J. A. BARRIENTOS 2020. Nuevos datos sobre las arañas (Araneae) de la isla de Nueva Tabarca (Alicante, España). *Revista Ibérica de Aracnología*, **36**: 144-146.*

HORMIGA, G. & C. RIBERA 1990. Sobre tres especies cavernícolas del género *Lepthyphantes* Menge, 1866 (Araneae: Linyphiidae) de la Península Ibérica (*Lepthyphantes gadesi* Fage, 1931; *L. fagei* Machado, 1939 y *L. bidentatus* n. sp.). *Revue Arachnologique*, **9**: 35-47.

KNOFLACH, B., C. ROLLARD & K. THALER 2009. Notes on Mediterranean Theridiidae (Araneae) – II. *ZooKeys* **16**: 227-264.

KRAUS, O. & M. KRAUS 1988. The genus *Stegodyphus* (Arachnida, Araneae). Sibling species, species groups and parallel origin of social living. *Verhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg*, **30**: 151-254.

LECIGNE, S. 2012. Inventaire aranéologique (Arachnida, Araneae) dans la ville d'Estepona (Málaga, Espagne). *Revista Ibérica de Aracnología* **21**: 161-167.

LEVY, G. & P. AMITAI 1982. The comb-footed spider genera *Theridion*, *Achaearanea* and *Anelosimus* of Israel (Araneae: Theridiidae). *Journal of Zoology, London* **196**: 81-131.

LISSNER, J. 2017. New records of spiders (Araneae) from Portugal. *Arachnologische Mitteilungen* **54**: 52-58.

LOCKET, G. H. & A. F. MILLIDGE 1951-1953. *British spiders.* Ray Society, London. **Vol. I**: 1-310 pp.; **Vol. II**: 1-449 pp.

LOCKET, G. H., A. F. MILLIDGE & P. MERRETT 1974. *British Spiders*, Volume III. Ray Society, London. **Vol. III**: 315 pp.

LOGUNOV, D. V. 2015. Taxonomic-faunistic notes on the jumping spiders of the Mediterranean (Aranei: Salticidae). *Arthropoda Selecta*, **24**(1): 33-85.

MACHADO. A. B. 1939. Trois nouvelles Araignées cavernicoles de l'Espagne. *Bulletin de la Société de Zoologie Francaise*, **64**: 60-70.

MACHADO, A. B. 1942. A colecao de aranhas cavernicolas do Museo Nacional de Ciencias Naturais de Madrid. *Anales de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias*, **7**: 1-15.

MARMANEU, J. M., G. MUÑOZ & J. A. REYES 2017. Primer registro de *Latrodectus lilianae* Melic, 2000 (Araneae: Theridiidae) en la provincia de Alicante. *Natura Lucentina*, **1**: 3-7.

MELIC, A. 2014. Notas sobre Gnaphosidae ibéricos (Araneae): descripción de dos nuevas especies del género *Zelotes* Gistel, 1848. *Revista Ibérica de Aracnología*, **25**: 9-14.*

MORADMAND, M. & P. JÄGER 2012. Taxonomic revision of the huntsman spider genus *Eusparassus* Simon, 1903 (Araneae: Sparassidae) in Eurasia. *Journal of Natural History*, **46**: 2439-2496.

MUÑOZ, G., J. M. MARMANEU & J. A. REYES 2017. Primera cita de *Micrommata aragonensis* Urones, 2004 (Fam. Sparassidae) en la provincia de Alicante. *Natura Lucentina*, **1**: 8-12.

MUÑOZ-MACIÁ, G. 2019. Catálogo preliminar de las arañas (Araneae) de la provincia de Alicante (sudeste de España). *Revista Ibérica de Aracnología*, **35**: 21-28.*

NENTWIG, W., T. BLICK, R. BOSMANS, D. GLOOR, A. HÄNGGI & C. KROPF 2021. *Araneae*. Version 02.2021. Online at https://www.araneae.nmbe.ch, accessed on 21/02/2021.

ORTUÑO, V. M., J. D. GILGADO, A. JIMÉNEZ-VALVERDE, A. SENDRA, G. PÉREZ-SUÁREZ & J. J. HERRERO-BORGOÑÓN 2013. The "Alluvial Mesovoid Shallow Substratum", a New Subterranean Habitat. *PloS ONE*, **8** (10): 1-16.

PLATNICK, N. I. & M. U. SHADAB 1977. A revision of the spider genera *Herpyllus* and *Scotophaeus* (Araneae, Gnaphosidae) in North America. *Bulletin of the American Museum of Natural History,* **159**: 1-44.

PLATNICK, N. I. & J. A. MURPHY 1984. A revision of the spider genera *Trachyzelotes* and *Urozelotes* (Araneae, Gnaphosidae). *American Museum Novitates*, **2792**: 1-30.

REIMOSER, E. 1919. Katalog der echten Spinnen (Araneae) des Palaarktischen Gebietes. *Abhandlungen der Zoologisch-Botanische Gesellschaft in Wien*, **10**: 1-280.

ŘEZÁČ, M., M. A. ARNEDO, V. OPATOVA, J. MUSILOVÁ, V. ŘEZÁČOVÁ & J. KRÁL 2018. Taxonomic revision and insights into the speciation mode of the spider *Dysdera erythrina* species-complex (Araneae: Dysderidae): sibling species with sympatric distributions. *Invertebrate Systematics*, **32** (1): 10-54.

RIBERA, C. 1981a. Sobre els generes *Lessertia* i *Scotoneta* (Arachnida: Araneae) a les cavitats de la Península ibérica. *Treballs de la Institució Catalana d'Història Natural*, **9**: 157-161.

RIBERA, C. 1981b. *Leptyphantes zaragozai* n. sp. y *Leptyphantes ibericus* n. sp. dos nuevas especies cavernicolas del Levante español (Arachnida: Araneae). *Publicaciones del Departamento de Zoología de Barcelona*, **7**: 39-45.

RIBERA, C. 1983. Sobre alguns Agelenidae i Hahnidae cavernicoles de la Peninsule Iberique (Araneae). *Speleon*, **26/27**: 29-32.

RIBERA, C. 2004. *Dysdera valentina* (Araneae, Dysderidae), una nueva especie de la provincia de Valencia, con algunas adiciones a la fauna cavernicola ibérica. *Revista Ibérica de Aracnología*, **9**: 211-215.*

RIBERA, C. & E. DE MAS 2015. Description of three new troglobiontic species of *Cybaeodes* (Araneae, Liocranidae) endemic to the Iberian Peninsula. *Zootaxa*, **3957** (3): 313-323.

ROBERTS, M. J. 1985-87. *The spiders of Great Britain and Ireland,* Volume 1: Volume 2: Volume 3: Linyphiidae and check list. Harley Books, Colchester, England, 204 pp.

ROBERTS, M. J. 1987. *The spiders of Great Britain and Ireland,* Volume 2: Linyphiidae and check list. Harley Books, Colchester, England, 204 pp.

ROBERTS, M. J. 1995. *Collins Field Guide: Spiders of Britain & Northern Europe*. HarperCollins, London, 383 pp.

SÁNCHEZ, I. & R. BOSMANS 2017. Novedades aracnológicas para la provincia de Cádiz (S. de España). *Revista de la Sociedad Gaditana de Historia Natural*, **11**: 33-52.

SANKARAN, P. M., J. T. D. CALEB & P. A. SEBASTIAN 2020. On the taxonomic validity of Indian ground spiders: III. Genus *Phaeocedus* Simon, 1893 (Araneae: Gnaphosidae). *Journal of Natural History* **54**(21-22): 1325-1336

SENGLET, A. 1972. Note sur les Spermophora (Araneae: Pholcidae) méditerranéens. *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft*, **45**: 307-319.

SENGLET, A. 2001. Copulatory mechanism in *Hoplopholcus*, *Stygopholcus* (revalited), *Pholcus*, *Spermophora* and *Spermophorides* (Araneae, Pholcidae) with additional faunistic and taxonomic data. *Mittteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft*, **74**: 43-67.

SENGLET, A. 2004. Copulatory mechanisms in *Zelotes*, *Drassyllus* and *Trachyzelotes* (Araneae, Gnaphosidae), with additional faunistic and taxonomic data on species from southwest Europe. *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft,* **77**(1-2): 87-119.

SENGLET, A. 2011. New species in the *Zelotes tenuis*-group and new or little known species in other *Zelotes* groups (Gnaphosidae, Araneae). *Revue Suisse de Zoologie*, **118**: 513-559.

SENGLET, A. 2012. *Civizelotes* new genus, and other new or little known Zelotinae (Araneae, Gnaphosidae). *Revue Suisse de Zoologie*, **119**: 501-528.

SIMON, E. 1907. Biospéologica III. Araneae, Chernetes et Opiliones (première série). *Archives de Zoologie Expérimentale et Générale,* (4)**6**: 537-553.

SIMON, E. 1914-1937. *Les arachnides de France*. *Synopsis générale et catalogue des espèces françaises de l'ordre des Araneae.* Tome VI. Roret Paris, 1298 pp.

TANASEVICH, A. V. 2019. Notes on some *Palliduphantes* Saaristo & Tanasevitch, 2001, with the description of a new species from the Iberian Peninsula (Araneae: Linyphiidae). *Revue Suisse de Zoologie*, **126** (2): 202-208.

THALER, K. & B**.** KNOFLACH 1998. *Zoropsis spinimana* (Dufour), eine für Österreich neue Adventivart (Araneae, Zoropsidae). *Berichte des Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereins in Innsbruck,* **85**: 173-185.

THORELL, T. 1875a. Diagnoses Aranearum Europaearum aliquot novarum. *Tijdschrift voor Entomologie,* **18**: 81-108.

THORELL, T. 1875b. Descriptions of several European and North African spiders. *Kongliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar*, **13**(5): 1-204.

URONES, C. 1988. Las especies de *Chiracanthium* C. L. Koch, 1939 (Araneae: Clubionidae) en la Península Ibérica. *Graellsia,* **43**: 139-152.

URONES, C. 2004. El género *Micrommata* (Araneae, Sparassidae) en la Península Ibérica, con la descripción do dos nuevas especies. *Revista Ibérica de Aracnología,* **10**: 41-52.*

URONES, C. & A. MAJADAS 2002. Cambios en la comunidad de Araneae durante la sucesión postfuego en matorrales mediterráneos de montaña. *Revista Ibérica de Aracnología*, **5**: 19-28.*

URONES, C., J. A. BARRIENTOS & A. ESPUNY 1995. El género *Anyphaena* Sundevall, 1833 (Araneae: Anyphaenidae) el la Península Ibérica. *Boletín de la Asociación Española de Entomología,* **19**: 109-131.

WESOŁOWSKA, W**.** 1986**.** A revision of the genus *Heliophanus* C. L. Koch, 1833 (Aranei: Salticidae). *Annales Zoologici, Warszawa,* **40**: 1-254.

WIEHLE, H. 1962**.** Eine Unterart von *Tetragnatha nitens* ([Savigny &] Audouin) aus Sardinien (Arach., Araneae). *Senckenbergiana Biologica,* **43**: 377-383.

WORLD SPIDER CATALOG 2021. Version 22.0. Natural History Museum Bern, online at http://wsc.nmbe.ch., accessed on 21/02/2021.

WUNDERLICH, J. 1980. Linyphiidae aus Süd-Europa und Nord-Afrika (Arachn.: Araneae). *Verhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg (NF),* **23**: 319-337.

WUNDERLICH, J**.** 1995a. Beschreibung bisher unbekannter Arten der Baldachinspinnen aus der östlichen Mediterraneis (Arachnida: Araneae: Linyphiidae). *Beiträge zur Araneologie,* **4** (1994): 655-686.

WUNDERLICH, J. 1995b**.** Zur Kenntnis mediterraner Arten der Gattung *Enoplognatha* Pavesi 1880, mit einer Neubeschreibung

(Arachnida: Araneae: Theridiidae). *Beiträge zur Araneologie,* **4** (1994): 703-713.

WUNDERLICH, J. 1995c. Revision der *Titanoeca tristis*-Gruppe, mit zwei Neubeschreibungen aus der westlichen Paläarktis (Arachnida: Araneae: Titanoecidae). *Beiträge zur Araneologie,* **4** (1994): 731-738.

WUNDERLICH, J. 2011. Extant and fossil spiders (Araneae). *Beiträge zur Araneologie,* **6**: 1-640.

WUNDERLICH, J. 2012. Few rare and a new species of spiders (Araneae) from Portugal, with resurrection of the genus *Chiracanthops* Mello-Leitao 1942 (Clubionidae: Eutichurinae). *Beiträge zur Araneologie,* **8**: 183-191.

WUNDERLICH, J. 2017. Descriptions, notes and synonyms of some mainly Mediterranean and Macaronesian spiders (Araneae) of various families. *Beiträge zur Araneologie,* **10**: 298-326, 354.

ZARAGOZA, J. A. & A. SENDRA 1988. Fauna cavernícola de la provincia de Alicante. Ayudas a la Investigación 1984-1985. *Inst. Cult. Juan Gil-Albert. Dip. Prov. Alicante*, **3**: 11-36.

* Referencias disponibles en www.sea-entomologia.org

Anexo A. Relación de las muestras estudiadas, ordenadas con un criterio alfabético de los taxones representados, indicando para cada una de ellas el estadio, sexo, fecha y lugar de captura. / **Annex A**. List of the samples studied, ordered with an alphabetical criterion of the taxa represented. The stage, sex, date and place of capture for each of them are indicated.

Familia AGELENIDAE (14♂♂, 22♀♀, 39jj)

Lycosoides coarctata (Dufour, 1831): 2♂♂, 3♀♀, 4jj, Elche (ciudad), 07-XI-2016; 15jj, idem, 25-V-2018; 5jj, idem, 14-VI-2018; 2jj, idem, 03-VII-2018; 1♂, idem, 20-IX-2018; 1♀, idem, 28-XI-2018; 2jj, idem, 13-VI-2019; 1♂, Elche (Maitino), 15-XI-2015; 1♀, idem, 27-III-2016; 1♀, idem, 05-V-2016; 1♂, idem, 24-X-2016; 1♀, 2jj, idem, 25-X-2016; 1♂, idem, 03-XI-2016; 1♂, idem, 15-XI-2016; 1♀, idem, 06-XII-2016; 1j, idem, 24-X-2017; 1♀, idem, 08-XI-2017; 1♀, idem, 11-XII-2017; 1♀, idem, 25-II-2018; 1j, idem, 23-V-2018; 1j, idem, 31-V-2018; 2jj, idem, 04-VI-2018; 1j, idem, 08-VIII-2018; 1♀, idem, 25-III-2019; 1j, idem, 09-VIII-2019; 1♂, 2jj, idem, 06-X-2019; 1♀, idem, 19-X-2019; 1♂, idem, 20-X-2019; 2♂♂, 1♀, 30-X-2019; 1♀, idem, 20-XI-2019; 2♀♀, idem, 24-XI-2019; 3♀♀, idem, 01-XII-2019; 2♀♀, idem, 07-IV-2020; 1♂, Elche (pantano), 15-X-2005; 2♂♂, idem, 22-X-2005.

Tegenaria pagana C.L. Koch, 1840: 1♀, Elche (Maitino), 20-I-2019.

Textrix caudata L. Koch, 1872: 1♀, Elche (Daimés), 26-VII-2016.

Familia ANYPHAENIDAE (5♀♀, 1j)

Anyphaena alboirrorata Simon, 1878: 1♀, Elche (ciudad), 07-XI-2016; 1♀, Elche (Maitino), 03-III-2019; 2♀♀, idem, 14-III-2019.

Anyphaena sabina L. Koch, 1866: 1♀, Elche (Maitino), 08-I-2018.

Anyphaena sp. (jj. indet.): 1j, Elche (Maitino), 11-IV-2020.

Familia ARANEIDAE (7♂♂, 31♀♀, 47jj)

Araneus angulatus Clerck, 1757: 1♀, Elche (ciudad), 15-VII-2004; 1♀, idem, 22-VII-2004; 1♀, Elche (La Marina), 21-IX-2016; 1♀, Elche (Maitino), 29-X-2015; 1j, idem, 29-III-2018; 1j, idem, 31-V-2018; 1♀, idem, 21-VIII-2019; 1j, idem, 24-VIII-2019; 1♀, Elche (Matola), 19-X-2010; 1j, idem, 22-V-2019; 1j, idem, 23-V-2019; 1♀, Elche (Torrellano), 07-VIII-2012.

Araneus sp. (jj. indet.): 1j, Elche (ciudad), 07-XI-2016; 1j, Elche (Maitino), 31-III-2017.

Argiope trifasciata (Forsskål, 1775): 1♂, Elche (Maitino), 28-IV-2019; 1♂, idem, 12-VIII-2019; 1♀, idem, 20-X-2019.

Cyclosa insulana (Costa, 1834): 4♀♀, Elche (Maitino), 17-IX-2015; 1j, idem, 20-VIII-2016; 2♀♀, idem, 29-X-2016; 1♀, idem, 12-IX-2018; 1♀, idem, 25-III-2019; 1♀, idem, 26-V-2019; 1♀, idem, 01-VIII-2019; 1♀, idem, 22-VII-2018; 1♀, idem, 20-X-2019; 1j, idem, 14-III-2020; 1j, idem, 22-III-2020; 1♀, 1j, idem, 10-V-2020; 1♀, Elche (Matola), 22-V-2019.

Cyrtophora citricola (Forsskål, 1775): 2♀♀, Elche (Maitino), 19-XI-2017; 1j, idem, 14-III-2019; 1j, idem, 11-IV-2020.

Larinia lineata (Lucas, 1846): 1j, Elche (Maitino), 20-XI-2019

Mangora acalypha (Walckenaer, 1802): 1♀, Elche (Maitino), 16-VIII-2019; 1♀, idem, 21-VII-2020.

Neoscona subfusca (C. L. Koch, 1837): 1♂, 1j, Elche (Maitino), 27-V-2018; 1♂, idem, 29-IX-2018; 1j, idem, 12-III-2019; 1♂, idem, 25-III-2019; 1j, idem, 11-V-2019; 1j, idem, 16-VI-2019; 1♀ idem, 06-VII-2019; 1j, idem, 27-VIII-2019; 1j, idem, 15-III-2020; 9jj, idem, 18-III-2020; 1j, idem, 25-III-2020; 3jj, idem, 11-IV-2020.

Zygiella x-notata (Clerck, 1757): 1♂, Elche (ciudad), 28-XI-2018; 1j, idem, 20-VIII-2020; 1♂, 1♀, 3jj, Elche (Maitito), 21-X-2017; 1♀, idem, 08-XI-2017; 1♀, 1j, idem, 25-III-2019; 1♀, idem, 19-X-2019; 1j, idem, 16-III-2020; 3jj, idem, 18-III-2020; 2jj, idem, 11-IV-2020; 1j, Elche (Matola), 22-V-2019; 2jj (sin datos).

Familia CHEIRACANTHIIDAE (2♂♂, 1♀♀, 9jj)

Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864: 1♂, Elche (ciudad), 09-III-2017; 1♀, 6jj, idem, 21-XI-2018; 1♂, Elche (Maitino), 04-V-2019.

Cheiracanthium sp. (jj. indet.): 1j, Elche (ciudad), 28-III-2018; 1j, Elche (Maitino), 16-VIII-2019; 1j, idem, 18-IV-2020.

Familia CLUBIONIDAE (7♀♀, 13jj)

Porrhoclubiona vegeta (Simon, 1918): 1j, Elche (ciudad), 21-XI-2018; 1♀, Elche (Maitino), 18-V-2016; 1j, idem, 30-X-2019; 4♀♀, idem, 18-III-2020; 2♀♀, idem, 11-IV-2020; 1j, idem, 10-X-2020.

Porrhoclubiona sp. (jj. indet.): 10jj, Elche (ciudad), 20-VIII-2020.

Familia DICTYNIDAE (2♂♂, 12♀♀, 4jj)

Brigittea civica (Lucas, 1850): 1♀, Elche (ciudad), 25-V-2018.

Lathys humilis (Blackwall, 1855): 1♂, Elche, 17-X-2018; 1j, Elche (Maitino), 01-VIII-2019; 3♀♀, idem, 15-III-2020; 2♀♀, idem, 16-III-2020; 2♀♀, idem, 09-IV-2020.

Nigma puella (Simon, 1870): 1♀, Elche (ciudad), 21-XI-2018; 1♀, idem, 27-XI-2018; 2♀♀, Elche (Maitino), 18-III-2020; 1♂, 2jj, idem, 11-IV-2020.

Nigma sp. (j. indet.): 1j, Elche (ciudad), 22-X-2016.

Familia DYSDERIDAE (10♂♂, 22♀♀, 16jj)

Dysdera crocata C.L. Koch, 1840: 1♀, Elche (Daimés), 26-VII-2016 ; 5♀♀, 2jj, Elche (ciudad), 21-X-2017; 1♀, Elche (Maitino), 28-VII-2002 ; 1♂, 1j, idem, 01-XI-2002 ; 2♀♀, idem, 28-XI-2002 ; 2♂♂, idem, 07-III-2003 ; 1♀, idem, 03-V-2003 ; 2♀♀, idem, 30-XI-2003 ; 1♂, 1♀, idem, 29-VII-2004 ; 1♀, idem, 11-I-2005 ; 1♀, idem, 13-III-2005 ; 1♀, idem, 10-VII-2005 ; 1♀, idem, 13-XII-2016 ; 1j, idem, 18-VII-2018 ; 2jj, idem, 08-VIII-2018 ; 1♀, idem, 23-XI-2018 ; 1♂, idem, 01-XII-2018 ; 1j, idem, 02-III-2019 ; 1♀, idem, 29-VI-2019 ; 1♀, idem, 24-XI-2019 ; 1♂, idem, 01-XII-2019 ; 1♂, idem, 28-I-2020 ; 1♂, 1♀, idem, 05-II-2020 ; 1♀, idem, 21-IV-2020 ; 1♂, 2jj, idem, 25-VI-2020 ; 1♂, idem, (sin fecha).

Dysdera sp. (jj. indet.): 1j, Elche (Maitino), 15-V-2005; 1j, idem, 01-X-2005; 4 jj, idem, 07-X-2004; 1j, idem, 01-XI-2002; 1j, idem, 04-IV-2020.

Familia ERESIDAE (1♂♂, 3♀♀, 4jj)

Eresus kollari Rossi, 1846: 1♂, Elche (Maitino), 12-V-2016.

Loureedia colleni Henriques, Miñano & Pérez-Zarcos, 2018: 1j, Elche, 13-II-2000; 1j, Elche (Maitino), 02-V-2020; 1♀, Elche (Torrellano), 20-VII-2006.

Stegodyphus lineatus (Latreille, 1817): 1j, Elche (Maitino), 16-VIII-2018; 2♀♀, idem, 11-IV-2019; 1j, Elche (Torrellano), 20-XI-2019.

Familia FILISTATIDAE (7♂♂, 25♀♀, 25jj)

Filistata insidiatrix (Forsskål, 1775): 1♀, Elche (Altet), 31-VIII-2005; 3♀♀, 1j, Elche (ciudad), 14-VI-2006; 1♀, idem, 17-I-2018; 3jj, idem, 26-XI-2018; 1♂, 2♀♀, idem, 27-XI-2018; 1j, idem, 28-XI-2018; 1♀, 3jj, idem, 05-IV-2019; 1♀, Elche (Maitino), 08-XI-2015;

1j, idem, 20-IV-2016; 1♀, idem, 08-V-2016; 1♀, idem, 26-VII-2016; 1♀, 1j, idem, 06-XII-2016; 1♀, 1j, idem, 07-XII-2017; 1♂, idem, 18-II-2018; 1j, idem, 23-V-2018; 1j, idem, 04-VI-2018; 1♀, idem, 08-VIII-2018; 1♂, idem, 29-XI-2018; 1♂, idem, 07-I-2019; 3jj, idem, 28-II-2019; 1j, idem, 03-III-2019; 1j, idem, 06-III-2019; 1♀, idem, 25-III-2019; 1♀, idem, 10-IV-2019; 1j, idem, 22-IV-2019; 2jj, idem, 01-VIII-2019; 3jj, idem, 09-VIII-2019; 6♀♀, idem, 27-X-2019; 1♂, 1♀, idem, 24-XI-2019; 1♂, idem, 31-XII-2019; 1♀, idem, 18-IV-2020; 1♀, 1j, idem, 28-VI-2020; 1♂, idem, (sin fecha).

Familia GNAPHOSIDAE (78♂♂, 57♀♀, 165jj)

Berlandina plumalis (O. Pickard-Cambridge, 1872): 1♀, Elche (Daimés), 26-VII-2016; 1♂, 1j, Elche (Maitino), 20-IX-2005; 1j, idem, 08-IV-2016; 1j, idem, 8-IV-2016; 1♂, 1j, idem, 25-IV-2016; 1♂, idem, 02-V-2016; 5♂♂, idem, 08-V-2016; 11♂♂, idem, 22-V-2016; 1j, idem, 11-VIII-2016; 1j, idem, 20-VIII-2016; 3♂♂, idem, 25-X-2016; 1j, idem, 28-X-2016; 1j, idem, 07-XI-2016; 1j, idem, 02-IV-2017; 1j, idem, 16-VII-2017; 1j, idem, 13-XII-2017; 2♀♀, 2jj, idem, 25-III-2019; 1j, idem, 11-IV-2019; 1j, Elche (pantano), 16-IX-2005.

Drassodes cupreus (Blackwall, 1834): 1♀, Elche (Maitino), 11-IV-2016.

Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802): 1♂, Elche (Maitino), 31-III-2018; 1j, idem, 18-IV-2018; 1♀, idem, 04-VI-2018; 1♀, idem, 13-III-2020.

Drassodes luteomicans (Simon, 1878): 1♀, Elche (Maitino), 09-VII-2020.

Drassodes sp. (jj.indet.): 1j, Elche (Maitino), 20-XI-2019.

Haplodrassus rufipes (Lucas, 1846) : 2♂♂, 1♀, Elche (Maitino), 17-III-2016 ; 2♂♂, idem, 23-III-2016 ; 1♀, idem, 22-V-2016 ; 1♂, idem, 12-II-2017 ; 2♂♂, idem, 23-II-2017 ; 1♂, idem, 04-III-2017 ; 3♂♂, 2♀♀, idem, 19-III-2017.

Haplodrassus securifer Bosmans & Abroux, 2018: 1♂, Elche (Maitino), 08-V-2016.

Heser schmitzi (Kulczyński, 1899): 1♀, Elche (Maitino), 15-VI-2018 ; 1♀, idem, 06-VII-2019 ; 1♀, idem, 01-VIII-2019 ; 1♀, idem, 27-VIII-2019.

Marinarozelotes fuscipes (L. Koch, 1866): 1♂, Elche (Maitino), 22-V-2016 ; 1j, idem, 03-XI-2017; 1♂, 1♀, 3jj, idem, 07-XII-2017; 2♂♂, 3♀♀, 1j, idem, 31-V-2018; 2♀♀, idem, 27-VII-2018; 2♀♀, 3jj, idem, 08-VIII-2018; 1♀, 1j, idem, 25-III-2019; 1j, idem, 11-IV-2019; 1♀, idem, 14-IV-2019; 2♂♂, idem, 20-XI-2019; 1♂, idem, 04-IV-2020; 1♀, idem, 05-VII-2020.

Marinarozelotes sp. (jj.indet.): 3jj, Elche (Maitino), 28-III-2018; 1j, idem, 06-III-2019; 1j, idem, 07-IV-2019; 1j, idem, 27-VIII-2019; 1j, idem, 13-III-2020; 5jj, idem, 09-IV-2020.

Micaria dives (Lucas, 1846): 1j, Elche (Maitino), 21-XI-2017; 3jj, idem, 10-XII-2017; 1j, idem, 28-II-2019.

Nomisia aussereri (L. Koch, 1872): 1♂, Elche (Maitino), 19-IX-2019.

Nomisia exornata (C.L. Koch, 1839): 1j, Elche (ciudad), 23-V-2018; 2♂♂, Elche (Maitino), 12-V-2016; 1♂, idem, 22-V-2016; 3♂♂, idem, 02-VI-2016; 2♂♂, 2♀♀, idem, 25-X-2016; 1j, idem, 07-XI-2016; 1j, idem, 10-XII-2017; 1j, idem, 26-V-2018; 1♀, idem, 27-V-2018; 2♀♀, idem, 05-VI-2018; 1j, idem, 22-VII-2018; 1♀, idem, 27-VII-2018; 3jj, idem, 16-VIII-2018; 1j, idem, 14-III-2019; 1j, idem, 11-V-2019; 1j, idem, 05-VI-2019; 1♂, idem, 10-V-2020; 1♂, Elche (pantano), 07-VI-2019.

Nomisia sp. (jj. Indet): 1j, Elche (Maitino), 01-X-2005; 1j, idem, 08-IV-2016;1j, idem, 28-XII-2018; 8jj, idem, 09-VIII-2019; 3jj, idem, 27-VIII-2019; 2jj, idem, 19-X-2019; 1j, idem, 27-X-2019; 1j, idem, 24-XI-2019; 1j, idem, 28-I-2020; 2jj, idem, 13-III-2020; 1j, idem, 09-IV-2020.

Poecilochroa senilis (O. Pickard-Cambridge, 1872): 1j, Elche (Maitino), 06-X-2019; 1♂, idem, 15-VI-2020.

Poecilochroa poonaensis (Tikader, 1982): 1♂, Elche (Maitino), 08-VIII-2019.

Pterotricha simoni Dalmas, 1921: 1♂, Elche (Maitino), 12-V-2016; 1♂, idem, 22-V-2016; 1j, idem, 28-X-2016.

Scotophaeus blackwalli (Thorell, 1871): 1♀, Elche (Maitino), 16-VII-2017; 1♂, idem, 22-IX-2017; 1♂, idem, 15-X-2017; 1♀, idem, 07-XII-2017; 1♀, idem, 17-II-2019; 1♀, idem, 29-VI-2020.

Scotophaeus sp. (jj. Indet.): 5jj, Elche (ciudad), 07-XI-2016; 1j, idem, 17-I-2018; 2jj, idem, 23-V-2018; 1j, idem, 21-XI-2018; 1j, idem, 27-XI-2018; 1j, Elche (Maitino), 20-III-2016; 2jj, idem, 27-III-2016; 1j, idem, 20-XI-2019.

Scotophaeus validus (Lucas, 1846): 1♀, 1j, Elche (ciudad), 26-XI-2018; 1♀, Elche (Maitino), 20-XI-2019.

Setaphis carmeli (O. Pickard-Cambridge, 1872): 1j, Elche (Maitino), 03-XI-2017; 1 j, idem, 20-XI-2019.

Zelotes callidus (Simon, 1878): 1♀, Elche (Daimés), 26-VII-2016; 1♀, Elche (Maitino), 07-VIII-2005; 2♀♀, idem, 27-VII-2018; 1♀, idem, 07-VIII-2019; 1♀, idem, 12-VIII-2019; 3♂♂, idem, 29-VI-2020; 3♂♂, idem, 05-VII-2020; 1♀, idem, 09-VII-2020; 1♂, idem, 13-VII-2020; 1♂, idem, 14-VII-2020; 1♀, idem, 26-VII-2020; 1♀, Elche (pantano), 03-IX-2005.

Zelotes flagellans (L. Koch, 1882): 2♂♂, 1♀, Elche (Maitino), 02-V-2016; 2♂♂, idem, 08-IV-2016 ; 1♂, 1j, idem, 02-IV-2017; 1♀, idem, 25-III-2019 ; 1♀, idem, 11-IV-2019.

Zelotes fuscorufus (Simon, 1878): 1♀, Elche (Maitino), 10-VII-2016.

Zelotes pediculatoides Senglet, 2011: 1♀, Elche (Maitino), 24-XI-2019.

Zelotes sp. (jj.indet.): 2jj, Elche (ciudad), 21-X-2017; 1j, Elche (Maitino), 17-IV-2016; 2jj, idem, 05-V-2016; 2jj, idem, 07-XI-2016; 2jj, idem, 03-XI-2017; 3jj, ídem, 14-III-2019; 2jj, idem, 25-III-2019; 5jj, idem, 13-IV-2019; 4jj, idem, 27-VIII-2019; 3jj, idem, 20-XI-2019; 1j, idem, 28-II-2020; 37jj, idem, 16-III-2020.

Zelotes tenuis (L. Koch, 1866): 1♀, Elche (ciudad), 14-VI-2018; 1j, Elche (Maitino), 03-XII-2016; 3♀♀, 2jj, idem, 07-VI-2019.

Zelotes uronesae Melic, 2014: 1♀, Elche (Maitino), 26-III a 08-IV-2016; 2♂♂, Elche (pantano), 15-X-2005; 4♂♂, 1j, idem, 22-X-2005.

Familia HERSILIIDAE (1♂)

Hersiliola macullulata (Dufour, 1831): 1♂, Elche (pantano), 07-VI-2019.

Familia LINYPHIIDAE (45♂♂, 123♀♀, 57jj)

Agyneta pseudorurestris Wunderlich, 1980: 1♀, Elche (Maitino), 23-II-2017; 2jj, idem, 01-II-2019; 1♀, idem, 28-II-2019; 1♂, 3♀♀, idem, 13-IV-2019; 1♀, 1j, idem, 01-VIII-2019; 1♂, idem, 01-XII-2019; 1♀, idem, 15-III-2020; 2♂♂, 6♀♀, 7jj, idem, 16-III-2020; 1♀, idem, 21-III-2020; 1♀, idem, 09-IV-2020; 2♀♀, 1j, idem, 02-V-2020

Agyneta sp.: 1j, Elche (Maitino), 12 a 22-V-2016; 1j, idem, 27-VIII-2019.

Canariphantes tenerrimus (Simon, 1929): 1♂, 1♀, Elche (Maitino), 14-III-2019; 1♀, idem, 09-IV-2020.

Canariphantes zonatus (Simon, 1884): 1♀, Elche (Maitino), 14-III-2019; 1♀, idem, 23-IV-2019; 1♀, idem, 20-XI-2019; 2♀♀, idem, 15-III-2020; 1♂, 3♀♀, 1j, idem, 09-IV-2020.

Diplocephalus graecus (O.P.-Cambridge, 1873): 1♂, Elche (Maitino), 10-I-2016; 1♀, idem, 10-XII-2017; 1♀, idem, 11-IV-2019.

Erigone dentosa O. P.-Cambridge, 1894: 1♂, Elche (Maitino), 15-VI-2018.

Microctenonyx subitaneus (O. P.-Cambridge, 1875): 2♀♀, Elche (ciudad), 30-VI-2018; 1♂, 1♀, Elche (Maitino), 10-XII-2017; 1♀, idem, 23-XII-2017; 1♀, 1j, idem, 28-II-2019; 2♂♂, 6♀♀, 1j, idem, 14-III-2019; 1♀, idem, 13-IV-2019; 1♂, 1♀, idem, 15-III-2020; 1♂, 6♀♀, idem, 16-III-2020; 1♀, 3jj, idem, 20-III-2020; 3♀♀, idem, 09-IV-2020; 1♀, idem, 24-IV-2020.

Ostearius melanopygius (O. P.-Cambridge, 1880): 1♀, Elche (ciudad), 26-VII-2016; 1♀, Elche (Maitino), 19-X-2019; 2♀♀, idem, 01-XII-2019; 1♀, idem, 28-I-2020; 1♂, idem, 28-II-2020.

Ouedia rufithorax (Simon, 1881): 2♀♀, Elche (Maitino), 14-III-2019; 1♀, idem, 07-IV-2019; 1♀, idem, 16-III-2020.

Pelecopsis bucephala (O. P.-Cambridge, 1875): 1♂, Elche (ciudad), 05-IV-2019; 1♀, Elche (Maitino), 28-IV-2016; 1♀, idem, 23-II-2017; 2♀♀, idem, 03-XI-2017; 2♀♀, idem, 10-XII-2017 ; 2♂♂, 2♀♀, idem, 23-V-2018 ; 1♂, 6♀♀, idem, 27-V-2018 ; 1♂, idem, 14-VI-2018 ; 2jj, idem, 14-III-2019 ; 7♂♂, 5♀♀, 9jj, idem, 13-IV-2019 ; 1♂, 2♀♀, 1j, idem, 11-V-2019 ; 8♀♀, 1j, idem, 27-VIII-2019 ; 1♀, idem, 17-IX-2019 ; 1♂, 1j, idem, 15-III-2020 ; 4♂♂, 3♀♀, 9jj, idem, 16-III-2020 ; 3♂♂, 3♀♀, 1j, idem, 04-IV-2020 ; 3♂♂, 5♀♀, 4jj, idem, 09-IV-2020.

Pelecopsis inedita (O. P.-Cambridge, 1875): 1♂, Elche (Maitino), 00-VII-2016; 1♂, 3♀♀, idem, 23-II-2017; 1♂, 1♀, idem, 10-XII-2017; 1♂, 6jj, idem, 27-VIII-2019; 1♀, idem, 16-III-2020.

Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852): 1♂, Elche (Maitino), 08-II-2019; 1♀, idem, 11-V-2019.

Typhochrestus bogarti Bosmans, 1990: 1♀, Elche (ciudad), 28-VII-2018; 1♀, 2jj, Elche (Maitino), 27-III-2016; 2♀♀, idem, 14-III-2019; 1♂, 10♀♀, 2jj, idem, 13-IV-2019; 1♂, idem, 16-III-2020.

Familia LYCOSIDAE (17♂♂, 12♀♀, 86jj)

Alopecosa albofasciata (Brullé, 1832): 1♂, Elche (Maitino), 23-III-2016; 1♂, idem, 17-IV-2016; 4jj, idem, 19-X-2019; 2jj, idem, 30-X-2019; 4jj, idem, 20-XI-2019; 8jj, idem, 24-XI-2019; 1j, idem, 15-III-2020; 1♂, idem, 28-III-2020; 1♂, idem, 07-IV-2020; 1♀, 1j, idem, 09-IV-2020; 1♂, idem, 26-IV-2020; 1♀, idem, 03-XI-2017; 2jj, idem, 10-XII-2017; 1j, idem, 19-XI-2017.

Alopecosa sp. (jj. indet.): 2jj, Elche (ciudad), 07-XI-2016; 9jj, idem, 15-XI-2018; 1j, idem, 28-XI-2018; 2jj, idem, 20-VIII-2020; 1j, Elche (Maitino), 10-II-2018; 2jj, idem, 27-VII-2018; 2jj, idem, 08-VIII-2018; 1j, idem, 16-VIII-2018; 1j, idem, 28-XII-2018; 3jj, idem, 14-III-2019; 5jj, idem, 01-VIII-2019; 1j, idem, 07-VIII-2019; 2jj, idem, 09-VIII-2019; 1j, idem, 27-VIII-2019.

Arctosa perita (Latreille, 1799): 1♂, Elche (Maitino), 29-III-2017; 1j, idem, 10-II-2018; 1♀, idem, 15-III-2020; 1j, idem, 04-VI-2020; 1♀, idem, 05-VII-2020.

Hogna ferox (Lucas, 1838): 1♂, Elche (Carrús), 15-V-2003; 1♂, Elche (ciudad), 07-IV-0000; 1♂, 1j, Elche (Daimés), 19-VII-2006; 1♀, Elche (Maitino), 14-VII-2002; 1♀, idem, 03-V-2003; 1♂, idem, 08-V-2016; 1♀, idem, 28-II-2019; 1♀, Elche (Matola), 13-VII-2006.

Hogna radiata (Latreille, 1817): 1♂,1j, Elche (Algoda), 00-VIII-2005; 1♀, 7jj, Elche (Maitino), 09-X-2002; 1♀, idem, 16-VIII-2018; 2jj, idem, 11-V-2019; 1♀, idem, 27-VII-2020.

Hogna sp. (jj. indet.): 1j, Elche (Algoda), 09-X-2005; 1j, Elche (Maitino), 17-II-2019; 2jj, idem, 11-IV-2019; 2jj, idem, 19-X-2019.

Lycosa fasciiventris (Dufour, 1835): 2♂♂, 4jj, Elche (Daimés), 26-VII-2016; 1♂, Elche (Maitino), 04-IX-2005; 1j, idem, 10-IV-2016; 1j, idem, 22-V-2016; 1j, idem, 02-VI-2016; 2♂♂, idem, 11-VIII-2016; 2jj, idem, 11-IV-2019; 1♀, Elche (Matola-Algoda), 13-VIII-2017.

Pardosa proxima (C. L. Koch, 1847): 1♂, Elche (Maitino), 02-IV-2017.

Trabea sp. (jj. indet.): 2jj, Elche (Maitino), 23-V-2018.

Familia MITURGIDAE (1j)

Zora sp. (jj. indet.): 1j, Elche (Maitino), 10-XII-2017.

Familia OECOBIIDAE (24♂♂, 57♀♀, 122jj)

Oecobius maculatus Simon, 1870: 1♂, Elche (ciudad), 30-IV-2018; 1♀, idem, 12-VI-2019; 1♂, Elche (Maitino), 25-IV-2016; 2♂♂, idem, 25-IV a 02-V-2016; 1♂, 1♀, idem, 08-V-2016; 4♂♂, idem, 12-V-2016; 2♂♂, 3♀♀, idem, 22-V-2016; 1♂, 1♀, idem, 02-VI-2016; 1♂, idem, 26-VII-2018; 1♀, idem, 03-VIII-2018; 1♀, idem, 08-VIII-2018; 1♀, idem, 10-VIII-2018; 1♀, 4jj, idem, 25-III-2019; 1♀, 2jj, idem, 07-IV-2019; 1♂, 1♀, 1j, idem, 10-IV-2019; 1♀, idem, 11-IV-2019; 1♂, 1♀, 1j, idem, 14-IV-2019; 1♀, idem, 06-V-2019; 1♀, idem, 11-V-2019; 1♀, idem, 14-VI-2019; 4♀♀, idem, 30-VII-2019; 1♀, idem, 06-VIII-2019; 1♀, idem, 27-VIII-2019.

Oecobius navus Blackwall, 1859: 1♂, Elche (ciudad), 31-V-2018; 1♂, 13♀♀, 2jj, idem, 02-VI-2018; 1♀, 3jj, idem, 30-VI-2018; 1♀, idem, 21-IX-2018; 1♂, 2♀♀, 1j, idem, 05-IV-2019; 1♂, idem, 15-IV-2019; 1♀, idem, 16-V-2019; 1♀, idem, 13-VI-2019; 1♀, Elche (La Marina), 16-IV-2019; 1♀, 7jj, Elche (Maitino), 02-XII-2015; 2♀♀, idem, 30-VII-2016; 1♀, idem, 29-III-2017; 1♂, 1♀, 1j, idem, 06-VIII-2017; 1♂, 3♀♀, 16jj, idem, 14-VIII-2017; 2♀♀, idem, 07-V-2018; 1♂, idem, 21-V-2018; 1♂, idem, 23-V-2018; 1♀, idem, 27-VI-2018; 1♀, idem, 04-II-2019; 1j, idem, 06-III-2019; 2jj, idem, 14-III-2019; 1♀, idem, 16-VI-2019; 1♀, idem, 11-VII-2019; 1♂, Elche (Matola), 22-V-2019. 1j, Elche (ciudad), 07-XI-2016; 41jj, Elche (Maitino), 03-XII-2016; 15jj, idem, 06-XII-2016; 17jj, idem, 21-X-2017.

Oecobius sp. (jj. indet.): 1j, Elche (ciudad), 21-XI-2018; 1j, idem, 26-XI-2018; 1j, Elche (Maitino), 28-II-2019; 1j, idem, 03-III-2019; 1j, idem, 27-X-2019; 2jj, idem, 13-III-2020.

Familia OONOPIDAE (27♂♂, 45♀♀, 4jj)

Oonops pulcher Templeton, 1835: 4jj, Elche (Maitino), 07-VIII-2019; 1♂, 1♀, idem, 15-III-2020; 1♂, idem, 09-IV-2020.

Silhouettella loricatula (Roewer, 1942): 2♀♀, Elche (Maitino), 06-XII-2016; 1♀, idem, 07-XII-2017; 2♂♂, 4♀♀, idem, 23-V-2018; 2♀♀, idem, 27-V-2018; 3♀♀, idem, 14-III-2019; 1♂, idem, 07-IV-2019; 2♂♂, 3♀♀, idem, 13-IV-2019; 2♂♂, 4♀♀, idem, 07-VIII-2019; 9♂♂, 13♀♀, idem, 27-VIII-2019; 2♂♂, idem, 15-III-2020; 2♂♂, 5♀♀, idem, 16-III-2020; 2♂♂, 4♀♀, idem, 04-IV-2020; 1♂, idem, 07-IV-2020; 2♂♂, 3♀♀, idem, 09-IV-2020.

Familia OXYOPIDAE (5♂♂, 4jj)

Oxyopes mediterraneus Levy, 1999: 1j, Elche (ciudad), 14-VI-2018; 1♂, Elche (Maitino), 08-IV-2016; 1♂, idem, 17-IV-2016; 1♂, idem, 12-V-2016; 2♂♂, 1j, idem, 25-X-2016.

Oxyopes sp. (jj. indet.): 1j, Elche (ciudad), 20-VIII-2020; 1j, Elche (Maitino), 27-VIII-2019.

Familia PALPIMANIDAE (1♀)

Palpimanus gibbulus Dufour, 1820: 1♀, Elche (Arenales del Sol), 17-X-2011.

Familia PHILODROMIDAE (52♂♂, 24♀♀, 62jj)

Philodromidae (jj. indet.): 2jj, Elche (ciudad), 20-VIII-2020.

Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802): 1♀, Elche (Maitino), 10-V-2020.

Philodromus sp. (jj. indet.): 1j, Elche (Maitino), 19-XI-2017; 5jj, idem, 07-XII-2017; 1j, idem, 29-XII-2017.

Pulchellodromus pulchellus (Lucas, 1846): 1♂, Elche (Maitino), 24-IV-2020.

Rhysodromus histrio (Latreille, 1819): 4jj, Elche (ciudad), 07-XI-2016; 1♀, idem, 02-VI-2018; 1j, idem, 27-XI-2018; 1j, idem, 28-XI-2018; 1♂, idem, 16-IV-2019; 1♂, idem, 17-IV-2019; 1♀, 1j, idem, 24-IV-2019; 2jj, Elche (Maitino), 27-III-2016; 7♂♂, idem, 02-V-2016; 4♂♂, idem, 08-V-2016; 2♂♂, idem, 12-V-2016; 4♂♂, idem, 22-V-2016; 1♀, idem, 02-VI-2016; 1♂, 3♀♀, idem, 25-X-2016; 1j, idem, 07-VI-2017; 1♂, 1j, idem, 11-III-2018; 1♀, idem, 13-V-2018; 1j, idem, 22-V-2018; 2♀♀, idem, 23-V-2018; 3jj, idem, 16-VIII-2018; 2jj, idem, 28-II-2019; 1j, idem, 03-III-2019; 2♀♀, 14jj, idem, 14-III-2019; 1♂, idem, 20-IV-2019; 1♂, idem, 11-V-2019; 1♀, idem, 17-VII-2019; 1j, idem, 01-VIII-2019; 2♀♀, idem, 11-VIII-2019; 1j, idem, 20-XI-2019; 1j, idem, 00-XII-2019; 2♀♀, idem, 15-III-2020; 2♂♂, 2jj, idem, 16-III-2020; 1♂, 2♀♀, 4jj, idem, 04-IV-2020; 1♂, 2♀♀, 3jj, idem, 09-IV-2020.

Thanatus fabricii (Audouin, 1826): 4♂♂, Elche (Maitino), 17a25-IV-2016.

Thanatus formicinus (Clerck, 1757): 1♂, Elche (Maitino), 02-V-2016; 1♀, idem, 11-IV-2019; 2♂♂, 1♀, 2jj, idem, 14-IV-2019.

Thanatus sp. (jj. indet.): 1j, Elche (Maitino), 25-III-2019; 1j, idem, 07-IV-2019 ; 1j, idem, 24-IV-2020.

Thanatus vulgaris (Simon, 1870): 1♂, Elche (Daimés), 19-VII-2006; 1j, Elche (ciudad), 28-III-2018; 1♀, idem, 14-VI-2018; 1♂, idem, 24-IV-2019; 1♂, Elche (Maitino), 08-V-2016; 4♂♂, idem, 22-V-2016; 7♂♂, idem, 02-VI-2016; 1♂, idem, 25-X-2016; 1j, idem, 07-VI-2017; 1♂, idem, 30-V-2019; 1♂, idem, 04-VI-2020.

Tibellus sp. (jj.indet.): 1j, Elche (Maitino), 05-III-2019; 1j, idem, 24-XI-2019.

Familia PHOLCIDAE (17♂♂, 26♀♀, 30jj)

Holocnemus caudatus (Dufour, 1820): 1♀, 1j, Elche (Maitino), 29-IX-2018; 2♀♀, 3jj, idem, 31-X-2018; 1♀, idem, 11-II-2019; 1♀, 1j, idem, 25-III-2019; 1♀, idem, 03-IV-2019.

Holocnemus hispanicus Wiehle, 1933: 1♂, Elche (Maitino), 13-VII-2020.

Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763): 1j, Elche (ciudad), 30-VI-2018; 1♂, idem, 27-XI-2018; 1♂, 1♀, Elche (Maitino), 04-VIII-2012; 6♂♂, 5♀♀, 2jj, idem, 29-X-2015; 1j, idem, 15-XI-2015; 1♂, idem, 10-I-2016; 1♂, 2♀♀, idem, 22-IV-2016; 1♂, 2♀♀, 7jj, idem, 08-V-2016; 1♀, idem, 16-VII-2016; 1j, idem, 24-X-2017; 1♂, 1j, idem, 13-V-2018; 1♀, idem, 15-VI-2018; 1j, idem, 08-VIII-2018; 1♂, idem, 29-V-2019; 1♀, idem, 07-VIII-2019; 1♀, idem, 11-VIII-2019; 1♀, idem, 25-VIII-2019; 1♂, 2j, idem, 06-X-2019; 2♂♂, 1♀, 2jj, idem, 27-X-2019; 5jj, idem, 29-X-2015; 1♀, Elche (Torrellano), 06-VI-2019.

Holocnemus sp. (jj. indet.): 1j, Elche (Maitino), 19-X-2019.

Spermophora senoculata (Dugès, 1836): 1j, Elche (Maitino), 03-XII-2016; 1♀, idem, 11-VII-2019; 1♀, Elche (ciudad), 21-X-2017; 1♀, Elche (Matola), 22-V-2019.

Familia PISAURIDAE (1♂, 5jj)

Pisaura mirabilis (Clerck, 1757): 1♂, Elche (Maitino), 10-III-2016; 1j, ídem, 23-XII-2017: 1j, idem, 16-VIII-2018; 2jj, idem, 27-VIII-2019; 1j, ídem, 27-X-2019.

Familia SALTICIDAE (95♂♂, 83♀♀, 234jj)

Aelurillus aeruginosus (Simon, 1871): 1♀, Elche (Maitino), 20-III-2016; 1♂, 1j, idem, 02-V-2016; 1j, idem 08-V-2016; 1♂, 1j, idem, 12-V-2016; 2jj, idem, 22-V-2016; 4♂♂, 1♀, idem, 22-V a 02-VI-2016; 3♂♂, idem, 25-X-2016; 1♂, 1j, idem, 24-XI-2016; 1♀, idem, 14-IV-2019; 1♀, idem, 24-V-2020; 1♀, Elche (pantano), 27-VIII-2005.

Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802): 12jj, Elche (Maitino), 18-III-2020; 13jj, idem, 11-IV-2020.

Ballus sp. (jj.indet.): 9jj, Elche (ciudad), 20-VIII-2020.

Chalcoscirtus infimus Simon, 1868: 1♀, Elche (Maitino), 20-III-2016; 1♀, idem, 02-V-2016; 1♀, idem, 22-V-2016; 1♂, idem, 24-IV-2020.

Chalcoscirtus sp. (jj. indet.): 1j, Elche (Maitino), 16-VIII-2018.

Cyrba algerina (Lucas, 1846): 1♂, Elche (Maitino), 14-V-2018; 1♀, Elche (pantano), 27-VIII-2005.

Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802): 1♂, Elche (Maitino), 07 a 15-XI-2016.

Euophrys rufibarbis (Simon, 1868): 1♂, Elche (Maitino), 17-X-2018; 1♂, 2jj, idem, 27-VIII-2019.

Euoprhys sp. (jj.indet.): 1j, Elche (Maitino), 02-VI-2016; 4jj, idem, 25-III-2019; 1j, Elche (ciudad), 30-VI-2015.
Evarcha jucunda (Lucas, 1846): 2♂♂, Elche (ciudad), 25-V-2018; 1♂, idem, 17-IV-2019; 1♀, idem, 20-VIII-2020; 1♂, Elche (Maitino), 27-III-2016; 1j, idem, 17-V-2016; 1♂, idem, 13-V-2017; 1♀, 1j, idem, 07-XII-2017; 1♀, idem, 20-XII-2017; 3jj, idem, 14-III-2019; 1♀, idem, 29-IV-2019; 1♂, idem, 29-V-2019; 1♂, idem, 15-VII-2019; 1♂, idem, 07-VIII-2019; 1j, idem, 30-X-2019; 1♂, idem, 20-XI-2019; 1♀, idem, 24-XI-2019; 1♂, idem, 29-IV-2020.
Hasarius adansoni (Audouin, 1826): 1♀, Elche (Carrús), 17-VIII-2017; 1j, Elche (ciudad), 30-VI-2015; 4♂♂, 4♀♀, 50 jj, idem, 07-XI-2016; 1♀, idem, 10-I-2017; 1♂, idem, 08-V-2018; 1♂, idem, 22-V-2018; 1j, idem, 23-V-2018; 1♂, idem, 05-VI-2018; 1♂, idem, 07-VI-2018; 2♀♀, 6jj, idem, 14-VI-2018; 1♂, idem, 25-VI-2018; 2jj, idem, 16-X-2018; 1♂, idem, 24-X-2018; 1♂, idem, 12-IX-2018; 1♂, 2jj, idem, 13-IX-2018; 1♂, Elche (Maitino), 29-V-2016; 1♂, idem, 26-VII-2016; 1♀, 1j, idem, 20-VIII-2016; 1♂, idem, 31-III-2017; 2jj, idem, 06-VIII-2017; 1♀, 3jj, idem, 21-X-2017; 1j, idem, 14-III-2019; 2♂♂, 2♀♀, idem, 07-VIII-2019; 1♂, 7♀♀, 10jj, idem, 09-VIII-2019; 1♀, idem, 11-VIII-2019; 1♀, 2jj, idem, 27-X-2019; 1♀, idem, 22-V-2020; 1♀, idem, 29-VI-2020.
Heliophanus apiatus Simon, 1868: 1♀, Elche (Maitino), 14-IV-2019.
Heliophanus sp.: 1j, Elche (ciudad), 26-XI-2018; 1j, Elche (Maitino), 22-VII-2018; 1j, idem, 28-II-2019.
Icius hamatus (C.L. Koch, 1846): 1♀, Elche (ciudad), 25-V-2018; 1♀, idem, 03-VIII-2018; 1♂, 2♀♀, idem, 21-XI-2018; 1♂, Elche (Maitino), 29-V-2016; 1♂, idem, 14-V-2018; 1♂, idem, 31-V-2018; 1♂, 2♀♀, 6jj, idem, 18-III-2020; 3jj, idem, 11-IV-2020; 1♂, idem, 13-VII-2020.
Icius sp. (jj. indet.): 1j, Elche (Maitino), 14-III-2019; 1j, idem, 20-XI-2019; 1j, idem, 11-IV-2020; 1j, idem, 05-VII-2020.
Icius subinermis Simon, 1937: 1♂, Elche (ciudad), 07-V-2018; 1♂, 1j, idem, 23-V-2018; 1♂, idem, 02-VI-2018; 1♀, idem, 27-XI-2018; 1♀, Elche (Maitino), 08-V-2016; 1j, idem, 29-III-2018; 3jj, idem, 16-VIII-2018; 1j, idem, 27-V-2018.
Salticidae (jj. indet.): 1j, Elche (Maitino), 07-VI-2017.
Leptorchestes mutilloides (Lucas, 1846): 1j, Elche (Maitino), 11-IV-2016.
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802): 1♀, Elche (ciudad), 07-V-2018; 1♀, idem, 16-V-2018.
Menemerus semilimbatus (Hahn, 1829): 1♂, Elche (ciudad), 21-III-2017; 1j, idem, 28-III-2018; 1♀, idem, 23-V-2018; 1♀, idem, 03-VII-2018; 1♂, idem, 25-VII-2018; 1♂, idem, 01-VIII-2018; 1j, idem, 13-IX-2018; 1♂, idem, 18-IV-2019; 1♂, idem, 04-VI-2019; 2♀♀, idem, 05-VI-2019; 1♀, Elche (Maitino), 29-V-2016; 2jj, idem, 19-III-2017; 1j, idem, 23-V-2018; 1♀, idem, 07-VI-2018; 1♂, idem, 30-VI-2018; 1j, idem, 27-VII-2018; 1♂, idem, 01-VIII-2018; 1♀, idem, 05-VIII-2018; 1j, idem, 14-III-2019; 1j, idem, 25-III-2019; 2jj, idem, 14-IV-2019; 1♀, idem, 11-V-2019; 1♀, idem, 11-VII-2019; 1j, idem, 19-VII-2019; 1j, idem, 15-III-2020; 1♀, idem, 10-V-2020; 1♀, idem, 24-V-2020; 1j, Elche (Matola), 16-V-2019; 1♂, 1♀, 1j, idem, 22-V-2019; 1j, Elche (pantano), 15-X-2005.
Menemerus taeniatus (L. Koch, 1867): 1♀, Elche (Maitino), 13-IX-2018; 1♂, idem, 21-V-2019; 1♂, Elche (Torrellano), 06-VI-2019.
Pellenes geniculatus (Simon, 1868): 1♂, Elche (Maitino), 08-V-2016; 1♀, idem, 02-VI-2016; 1♀, idem, 25-X-2016.
Phlegra bresnieri (Lucas, 1846): 1♂, Elche (Maitino), 00-III-2017; 1j, idem, 22-VII-2018; 2jj, idem, 16-VIII-2018; 1j, idem, 28-II-2019; 1♂, idem, 14-III-2019; 1♀, idem, 14-IV-2019; 1j, idem, 19-X-2019.
Plexippus paykulli (Audouin, 1826): 1♂, 1♀, Elche (ciudad), 30-VI-2015; 1♂, idem, 23-V-2018; 1j, idem, 25-V-2018; 1j, idem, 02-VI-2018; 1♂, idem, 27-VI-2018; 1j, idem, 03-VII-2018; 1♀, idem, 19-VII-2018; 1♀, idem, 01-IX-2018; 1♂, idem, 26-XI-2018; 1j, idem, 17-IV-2019; 1j, idem, 18-IV-2019; 1♀, idem, 02-V-2019; 1♂, idem, 04-VI-2019; 1♂, idem, 05-VI-2019; 1j, Elche (Maitino), 30-XI-2015; 1j, idem, 28-IV-2016; 1♂, idem, 08-V-2016; 1♂, idem, 26-VII-2016; 2jj, idem, 20-VIII-2016; 1j, idem, 22-III-2017; 1♀, idem, 28-VI-2017; 1j, idem, 07-VII-2017; 1♂, idem, 05-VIII-2017; 1j, idem, 21-X-2017; 2jj, idem, 03-XI-2017; 1j, idem, 08-XI-2017; 1j, idem, 07-XII-2017; 1♂, idem, 24-IV-2018; 1j, idem, 07-V-2018; 1♀, 1j, idem, 14-V-2018; 1♀, idem, 15-VI-2018; 1♀, idem, 30-VI-2018; 1♂, idem, 08-VII-2018; 1♂, idem, 14-VII-2018; 1j, idem, 08-VIII-2018; 1j, idem, 09-IX-2018; 1♀, idem, 17-X-2018; 1j, idem, 28-II-2019; 1♂, idem, 01-III-2019; 8jj, idem, 14-III-2019; 1j, idem, 14-IV-2019; 1j, idem, 13-VII-2019; 1♀, idem, 15-VII-2019; 1♂, 1j, idem, 01-VIII-2019; 3jj, idem, 07-VIII-2019; 2jj, idem, 09-VIII-2019; 1♀, idem, 18-IX-2019; 2jj, idem, 19-X-2019; 1♂, 1♀, 1j, idem, 27-X-2019; 1j, idem, 00-XII-2019; 1♂, idem, 14-III-2020; 6jj, idem, 11-IV-2020; 1♂, idem, 22-V-2020; 1♀, idem, 24-V-2020; 1♂, idem, 15-VI-2020; 1♀, idem, 25-VI-2020; 1j, idem, 29-VI-2020; 1♀, idem, 05-VII-2020; 1♂, idem, 13-VII-2020.
Psedeuophrys sp. (jj. indet.): 2jj, Elche (ciudad), 21-XI-2018; 1j, Elche (Maitino), 02-III-2019.
Pseudeuophrys nebrodensis Alicata & Cantarella, 2000: 1♂, Elche (Maitino), 25-IV-2016; 1♀, idem, 05-V-2016; 1♂, idem, 06-IV-2018; 1♂, idem, 24-II-2019; 1♀, idem, 09-VIII-2019; 1♀, Elche (zona Carrefour), 23-V-2019;
Salticus propinquus Lucas, 1846: 1♀, Elche (pantano), 26-III-2005.
Salticus confusus Lucas, 1846: 1♂, Elche (Maitino), 11-V-2019.
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837): 1j, Elche (ciudad), 30-VI-2015; 1♂, idem, 21-V-2019; 1♂, Elche (Maitino), 23-V-2018.
Thyene imperialis (Rossi, 1846): 1♂, Elche (ciudad), 12-VI-2019; 1♂, Elche (Las Bayas), 25-VI-2018; 1♂, Elche (Maitino), 08-IX-2005; 1♂, idem, 04-VIII-2012; 1♂, idem, verano-2016; 1j, idem, 02-III-2019; 1j, idem, 25-III-2019.

Familia SCYTODIDAE (16♂♂, 40♀♀, 16jj)

Scytodes velutina Heineken & Lowe, 1832: 1♀, Elche (Arenales del Sol), 17-X-2011; 1♀, Elche (ciudad), 28-VII-2018; 1♀, idem, 13-VI-2019; 1♀, Elche (La Hoya), 18-VI-2019; 1♀, Elche (Maitino), 08-IX-2005; 1♂, idem, 14-III-2017; 1♀, idem, 31-III-2017; 1j, idem, 07-VII-2017; 2♀♀, idem, 13-VII-2017; 1j, idem, 27-VI-2018; 1♀, idem, 05-VII-2018; 1♀, idem, 27-VII-2018; 5♀♀, 5jj, idem, 08-VIII-2018; 1♀, idem, 02-X-2018; 1♀, idem, 13-X-2018; 3♂♂, 3♀♀, 2jj, idem, 02-III-2019; 10♂♂, 4♀♀, 3jj, idem, 14-III-2019; 1♀, idem, 13-IV-2019; 1♀, idem, 11-V-2019; 1♀, idem, 03-VI-2019; 1♀, idem, 15-VII-2019; 4♀♀, 2jj, idem, 01-VIII-2019; 1♀, idem, 07-VIII-2019; 1j, idem, 29-IX-2019; 1♂, 3♀♀, idem, 27-X-2019; 1♂, idem, 16-III-2020; 1♀, idem, 09-IV-2020; 1♀, 1j, idem, 22-V-2020; 2♀♀, idem, 25-VI-2020.

Familia SEGESTRIIDAE (1♂, 1♀)

Segestria pusiola Simon, 1882: 1♀, Elche (Maitino), 28-III-2018; 1♂, idem, 15-III-2020.

Familia SICARIIDAE (16♂♂, 24♀♀, 25jj)

Loxosceles rufescens (Dufour, 1820): 1j, Elche (Arenales del Sol), 16-XI-2019; 2♀♀, 5jj, Elche (ciudad), 30-VI-2018; 2♀♀, 1j, idem, 07-VII-2018; 1♀, 2jj, idem, 21-VII-2018; 1♀, 2jj, idem, 28-VII-2018; 1♀, idem, 15-X-2009; 2♂♂, 1♀, Elche (La Hoya), 18-VI-2019; 1♂, 1♀, Elche (Maitino), 02-IX-2014; 1♂, idem, 07-III-2015; 1♂, idem, 00-X-2015; 1♂, idem, 10-III-2016; 1♂, idem, 00-VII-2016; 1♀, idem, 20-VIII-2016; 1♂, 1♀, idem, 25-X-2016; 2♀♀, idem, 03-XI-2016; 1♀, idem, 12-VII-2017; 1♂, idem, 15-VII-2017; 1♀, idem, 14-VIII-2017; 1♂, 2jj, idem, 21-X-2017; 1j, idem, 04-XI-2017; 1♀, idem, 17-I-2018; 1♂, idem, 21-IV-2018; 1j, idem, 15-V-2018; 1♀, idem, 20-X-2018; 1♀, idem, 04-XI-2018; 1♀, idem, 30-XI-2018; 1j, idem, 20-II-2019; 1♀, 2jj, idem, 25-III-2019; 2jj, idem, 07-IV-2019; 1j, idem, 10-IV-2019; 1j, idem, 20-IV-2019; 1♀, idem, 07-V-2019; 1j, idem, 27-VI-2019; 1♀, idem, 04-X-2019; 1♀, idem, 13-III-2020; 1j, idem, 18-IV-2020; 1♂, idem, 30-VI-2020; 1♂, 1♀, idem, 15-VII-2020; 1♂, idem, 19-VII-2020; 1♂, Elche (pantano), 27-VIII-2005; 1♂, idem, 03-IX-2005; 1j, idem, 15-X-2005.

Familia SPARASSIDAE (1♂♂ 2♀♀, 3jj)

Micrommata ligurina (C.L. Koch, 1845): 1♀, Elche (Maitino), 29-III-2018; 1♀, idem, 10-IV-2019; 1♂, idem, 25-I-2020.
Micrommata sp. (jj.indet.): 1j, Elche (La Hoya), 18-VI-2019; 1j, Elche (Maitino), 07-XII-2017; 1j, idem, 18-III-2020.

Familia TETRAGNATHIDAE (1♀, 1j)

Tetragnatha intermedia Kulczynski, 1891: 1♀, Elche (Maitino), 25-VI-2020.
Tetragnatha sp. (jj. indet.): 1j, Elche (Maitino), 11-IV-2020

Familia THERIDIIDAE (35♂♂, 118♀♀ 136jj)

Asagena phalerata (Panzer, 1801): 1♀, Elche (Maitino), 14-IV-2019; 1♂, idem, 29-IV-2020.
Crustulina scabripes Simon, 1881: 1♂, Elche (Maitino), 29-V-2016; 1j, idem, 07-XII-2017; 1♀, idem, 08-VIII-2018; 1♀, 3jj, idem, 28-II-2019; 2♀♀, idem, 14-III-2019; 1♀, idem, 04-IV-2020; 2jj, idem, 09-IV-2020; 1♂, idem, 16-V-2019; 1♂, idem, 07-VI-2019; 1♂, idem, 14-VI-2019; 2♀♀, idem, 27-X-2019; 1j, idem, 15-III-2020; 1♀, 2jj, idem, 18-IV-2020; 1♂, idem, 24-V-2020; 1♂, idem, 30-V-2020; 1♀, idem, 15-VI-2020.
Cryptachaea amilcari **sp.n**.: 2♀♀, Elche (ciudad, Hort de Baix), 21-X-2017.

Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837): 1j, Elche (Maitino), 18-III-2020; 2♀♀, idem, 11-IV-2020.
Enoplognatha diversa (Blackwall, 1859): 1j, Elche (Maitino), 30-XI-2015; 1♂, idem, 15-III-2016; 2jj, idem, 07-XII-2017.
Enoplognatha mandibularis (Lucas, 1846): 1♂, Elche (ciudad), 27-XI-2018; 1♀, idem, 16-IV-2019; 1♂, Elche (Maitino), 07-II-2013; 1♀, idem, 17-III-2016; 1♀, idem, 30-I-2017; 2♀♀, idem, 04-VI-2018; 3♀♀, 1j, idem, 14-III-2019; 1♀, idem, 15-III-2020.
Enoplognata sp. (jj. ident.): 1j, Elche (ciudad), 17-I-2018; 5jj, idem, 28-III-2018; 1j, Elche (Maitino), 06-XII-2016; 1j, idem, 21-X-2017; 1j, idem, 07-IV-2018; 1j, idem, 20-I-2019; 1j, idem, 04-II-2019; 1j, idem, 13-IV-2019; 1j, idem, 20-XI-2019.
Euryopis episinoides (Walckenaer, 1847): 1♂, Elche (ciudad), 02-VIII-2018; 1♀, idem, 13-IX-2018; 1j, idem, 16-X-2018; 1♂, Elche (Las Bayas), 02-V-2018; 1j, Elche (Matino), 07-VI-2017; 1♀, idem, 05-VI-2018; 1♂, idem, 19-VII-2018; 1♀, 2jj, idem, 22-VII-2018; 1♀, 1j, idem, 08-VIII-2018; 1j, idem, 16-VIII-2018; 1♀, idem, 07-VI-2019; 1♀, idem, 11-VII-2019; 2♂♂, idem, 01-VIII-2019; 1j, idem, 07-VIII-2019; 1♀, idem, 09-VIII-2019; 1j, idem, 27-VIII-2019; 2jj, idem, 20-XI-2019; 1♂, idem, 21-III-2020; 1j, idem, 09-IV-2020; 1♂, idem, 15-VI-2020.
Kochiura aulica (C.L. Koch, 1838): 1♂, Elche (ciudad), 04-V-2018; 1♀, idem, 23-V-2018; 1♀, 1j, idem, 04-VII-2018; 3♀♀, 1j, idem, 21-V-2019; 13♀♀, 14jj, idem, 20-VIII-2020; 1♀, Elche (Maitino), 20-III-2016; 1j, idem, 08-V-2016; 3jj, idem, 29-X-2016; 1♂, idem, 06-XII-2016; 1j, idem, 29-III-2017; 1♀, idem, 27-VIII-2017; 1j, idem, 08-XI-2017; 1j, idem, 20-III-2019; 1♀, idem, 25-III-2019; 1j, idem, 11-IV-2019; 1♀, idem, 14-IV-2019; 2♀♀, idem, 16-XI-2019; 1♀, idem, 17-XI-2019; 1♀, idem, 14-III-2020; 1♀, idem, 10-V-2020.
Lasaeola sp. (jj. indet.): 1j, Elche (Maitino), 27-III-2016.
Latrodectus sp. (jj. indet.): 1j, Elche (Maitino), 11-V-2019.
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802): 1♀, Elche (ciudad), 20-VIII-2020.
Ruborridion musivum (Simon, 1873): 1♀, Elche (Maitino), 05-IV-2018.
Sardinidion blackwalli (O. Pickard-Cambridge, 1871): 1♂, Elche (ciudad), 23-V-2018; 1♂, Elche (Maitino), 08-V-2018.
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838): 1j, Elche (ciudad), 07-XI-2016; 1♀, Elche (Maitino), 22-X-2016; 2♂♂, 1j, idem, 21-X-2017.
Steatoda paykulliana (Walckenaer, 1805): 1j, Elche (El Altet), 31-VIII-2005; 1j, Elche (ciudad), 07-XI-2016; 1♀, idem, 02-VI-2018; 1j, idem, 14-VI-2018; 1j, idem, 27-XI-2018; 4jj, idem, 28-XI-2018; 1♀, Elche (Maitino), 09-V-2016; 1♀, idem, 25-X-2016; 1j, idem, 14-VI-2017; 1j, idem, 21-X-2017; 1♀, idem, 16-VIII-2018; 1♀, idem, 11-IV-2019; 1♀, idem, 14-IV-2019; 2jj, idem, 11-VII-2019; 3jj, idem, 01-VIII-2019; 1j, idem, 09-VIII-2019; 1j, Elche (pantano), 07-VI-2019; 1j, Elche (Valverde), 16-X-2018; 7jj, idem, 22-X-2018.
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802): 2jj, Elche (ciudad), 13-VI-2019; 1♀, Elche (La Hoya), 18-VI-2019; 1♂, Elche (Maitino), 10-I-2016; 1♀, idem, 02-IV-2016; 1♀, idem, 11-IV-2016; 1j, idem, 20-VIII-2016; 1j, idem, 03-XII-2016; 1♀, idem, 29-III-2017; 1♂, idem, 27-VIII-2017; 1♀, idem, 03-X-2017; 1♂, 1♀, 1j, idem, 15-X-2017; 1♀, idem, 25-X-2017; 1j, idem, 17-XI-2017; 1♀, idem, 20-V-2018; 1♀, idem, 01-VI-2018; 4♀♀, 4jj, idem, 27-VI-2018; 1♀, 1j, idem, 19-VII-2018; 2♀♀, idem, 21-VII-2018; 1♂, 1♀, 1j, idem, 29-VII-2018; 1♂, idem, 05-VIII-2018; 2♀♀, idem, 06-VIII-2018; 1♀, idem, 12-VIII-2018; 1♀, idem, 17-VIII-2018; 2♀♀, 3jj, idem, 06-IX-2018; 1♀, 1j, idem, 20-IX-2018; 1♂, idem, 02-X-2018; 1♀, idem, 31-X-2018; 1♀, idem, 01-XII-2018; 1♀, idem, 29-V-2019; 1♀, idem, 24-VI-2019; 1j, idem, 11-VII-2019; 1♀, idem, 30-VII-2019; 1j, idem, 01-VIII-2019; 1♂, 1♀, 3jj, idem, 29-IX-2019; 1♀, idem, 06-X-2019; 1♂, 1♀, idem, 30-X-2019; 1♀, idem, 00-XII-2019; 1♀, idem, 28-I-2020; 1j, idem, 10-II-2020; 1♀, idem, 21-II-2020; 1j, idem, 09-IV-2020; 1♂, idem, 29-IV-2020; 1♀, idem, 23-V-2020; 1♀, Elche (Matola), 16-V-2019; 2♀♀, idem, 22-V-2019; 1♀, Elche (Torrellano), 06-VI-2019; 1j, Elche (Valverde), 22-X-2018.
Theridion hannoniae Denis, 1945: 1♀, Elche (ciudad), 24-X-2018; 1♂, Elche (Maitino), 04-VII-2019,
Theridion mystaceum L. Koch, 1870: 1♀, Elche (ciudad), 04-V-2018; 1♀, idem, 07-V-2018; 1j, idem, 13-V-2018; 1♀, idem, 25-V-2018; 2♀♀, idem, 02-VI-2018; 1♀, idem, 30-VI-2018; 3jj, idem, 27-XI-2018; 2jj, idem, 28-XII-2018; 2jj, idem, 05-IV-2019; 1♂, 2jj, idem, 20-VIII-2020; 3jj, Elche (Maitino), 21-X-2017; 1♀, idem, 08-V-2018; 1♀, idem, 14-IV-2019; 1♀, idem, 11-V-2019; 1j, idem, 18-III-2020; 1♀, idem, 11-IV-2020; 1♂, 2jj, Elche (Matola), 16-V-2019; 1♀, idem, 21-V-2019.
Theridion sp. (jj. indet.): 1j, Elche (ciudad), 30-VI-2018; 1j, Elche (Maitino), 20-III-2016; 1j, idem, 07-IV-2019; 1j, idem, 04-IV-2020.

Familia THOMISIDAE (10♂♂, 6♀♀, 41jj)

Bassaniodes bliteus (Simon, 1875): 1♂, Elche (Maitino), 13-X-2016; 1♂, 2jj, idem, 25-X-2016; 2♂♂, idem, 07-XI-2016; 1♀, idem, 06-XII-2016; 1♂, idem, 17-X-2018.
Bassaniodes bufo (Dufour, 1820): 2♂♂, Elche (Maitino), 08-IX-2005; 1♀, idem, 14-II-2018; 1j, idem, 05-VI-2018; 1j, idem, (sin fecha).
Misumena vatia (Clerck, 1757): 1♂, Elche (Arenales del Sol), 27-VI-2019.
Monaeses paradoxus (Lucas, 1846): 1j, Elche (Maitino), 01-X-2005; 1j, idem, 23-III-2019; 1♀, idem, 15-VII-2019; 1j, idem, 07-VIII-2019; 1j, idem, 27-VIII-2019; 1j, idem, 20-XI-2019.
Synema globosum (Fabricius, 1775): 1j, Elche (ciudad), 30-VI-2018; 1♀, 9jj, idem, 20-VIII-2020; 1j, idem, 21-X-2017; 1j, Elche (Maitino), 16-VIII-2018.
Thomisus onustus Walckenaer, 1805: 1♀, Elche (Maitino), 07-VIII-2019; 1♂, idem, 15-VI-2020.
Tmarus staintoni (O. Pickard-Cambridge, 1873): 5jj, Elche (Maitino), 18-III-2020; 6jj, idem, 11-IV-2020.
Xysticus nubilus Simon, 1875: 1♂, Elche (Maitino), 29-III-2017; 1♀, idem, 20-VI-2020.
Xysticus sp. (jj.indet.): 1j, Elche (ciudad), 02-VI-2018; 1j, Elche (Maitino), 21-X-2017; 3jj, idem, 16-VIII-2018; 1j, idem, 04-XI-2018; 1j, idem, 27-VIII-2019; 1j, idem, 01-XII-2019; 1j, idem, 31-XII-2019.

Familia TITANOECIDAE (1j)

Titanoeca hispanica Wunderlich, 1995: 1j, Elche (Maitino), 01-XII-2019.

Familia ULOBORIDAE (2♂♂, 14♀♀, 11jj)

Uloborus plumipes Lucas, 1846: 1♂, Elche (Maitino), 16-VIII-2015; 1♀, idem, 17-IX-2015; 1j, idem, 29-X-2015 ; 1♀, idem, 08-V-2016; 1♀, idem, 17-V-2016; 1j, idem, 31-III-2017; 1j, idem, 19-XI-2017; 1♀, idem, 15-IV-2018; 1j, idem, 29-IX-2018; 3♀♀, 1j, 20-III-2019; 1♂, 1♀, idem, 21-IV-2019; 1♀, 1j, idem, 22-V-2019; 1j, idem, 15-VII-2019; 1♀, idem, 06-X-2019; 2jj, idem, 27-X-2019; 1j, idem, 16-III-2020; 1j, idem, 04-IV-2020; 2♀♀, idem, 12-IV-2020; 2♀♀, idem, 20-VII-2020.

Familia ZODARIIDAE (21♂♂, 9♀♀, 17jj)

Zodarion affine (Simon, 1870): 1♂, Elche (Maitino), 08-IV-2016; 1♀, idem, 02-V-2016; 2♂♂, idem, 08-V-2016; 3♂♂, idem, 12-V-2016; 2♂♂, idem, 22-V-2016; 1♂, idem, 02-VI-2016; 1♀, idem, 25-X-2016; 1♀, idem, 25-III-2019.
Zodarion costablancae Bosmans, 1994: 1♂, Elche (ciudad), 30-VI-2018; 1♀, idem, 21-VII-2018.
Zodarion isabellinum (Simon, 1870): 1♂, Elche (Maitino), 08-XI-2017; 1♂, idem, 19-XI-2017; 3♂♂, 1♀, 2jj, idem, 23-V-2018; 1♀, idem, 08-VIII-2018; 1♂, 2jj, idem, 13-IV-2019; 1♂, idem, 06-V-2019; 1♂, 1♀, idem, 07-VIII-2019; 1♂, idem, 09-VIII-2019; 1♂, 3jj, idem, 16-III-2020; 1♂, 2♀♀, 1j, idem, 09-IV-2020.
Zodarion sp. (jj. indet.): 1j, Elche (Maitino), 25-IV-2016; 1j, idem, 27-V-2018; 3jj, idem, 14-III-2019; 4jj, idem, 11-V-2019.

Familia ZOROPSIDAE (3♂♂, 7♀♀, 7jj)

Zoropsis sp. (jj. indet.): 1j, Elche (Maitino), 17-IX-2005; 1j, idem, 20-VIII-2016; 1j, idem, 11-VII-2019; 1j, idem, 11-VIII-2019; 1j, idem, 16-VIII-2019; 2jj, idem, 27-X-2019.
Zoropsis spinimana (Dufour, 1820): 1♀, Elche (ciudad), 01-V-2005; 1♂, Elche (Las Bayas), 25-XII-2019; 1♂, Elche (Maitino), 10-XII-2015; 1♀, idem, 03-XI-2017; 1♂, idem, 12-II-2019; 1♀, idem, 04-IV-2019; 1♀, idem, 20-XI-2019; 1♀, idem, 12-IV-2020; 1♀, idem, 18-IV-2020; 1♀, Elche (pantano), 09-X-2005.

Anexo B. Taxones representados en el estudio, indicando su valor faunístico (primeras citas para España, Comunidad Valenciana y/o provincia de Alicante). **ES**: primera cita para España. **CV**: primera cita para la Comunidad Valenciana. **AL**: primera cita para la provincia de Alicante. *: endemismo de la Península Ibérica. / **Annex B**. Taxa represented in the study, indicating their faunal value (first citations for Spain, Valencian Community and / or province of Alicante). **CV**: first appointment for the Valencian Community. **ES**: first appointment for Spain. **AL**: first appointment for the province of Alicante. *: endemism of the Iberian Peninsula.

TAXON	ES	CV	AL	*
AGELENIDAE C. L. Koch, 1837				
Textrix Sundevall, 1833			✓	
Textrix caudata L. Koch, 1872			✓	
ANYPHAENIDAE Bertkau, 1878		✓		
Anyphaena Sundevall, 1833		✓		
Anyphaena alboirrorata Simon, 1878		✓		
Anyphaena sabina L. Koch, 1866		✓		
ARANEIDAE Clerck, 1757				
Larinia Simon, 1874			✓	
Larinia lineata (Lucas, 1846)			✓	
Zygiella F.O. Pickard-Cambridge, 1902		✓		
Zygiella x-notata (Clerck, 1757)		✓		
CHEIRACANTHIIDAE Wagner, 1887				
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864			✓	
DICTYNIDAE O. Pickard-Cambridge, 1871				
Brigittea Lehtinen, 1967		✓		
Brigittea civica (Lucas, 1850)		✓		
Lathys Simon, 1884		✓		
Lathys humilis (Blackwall, 1855)		✓		
Nigma Lehtinen, 1967			✓	
Nigma puella (Simon, 1870)			✓	
ERESIDAE C. L. Koch, 1845				
Eresus Walckenaer, 1805			✓	
Eresus kollari Rossi, 1846			✓	
Loureedia colleni Henriques *et al*., 2018				✓
GNAPHOSIDAE Pocock, 1898				
Drassodes Westring, 1851			✓	
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834)		✓		
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802)			✓	
Drassodes luteomicans (Simon, 1878)		✓		
Haplodrassus securifer Bosmans & Abrous, 2018		✓		
Micaria Westring, 1851			✓	
Micaria dives (Lucas, 1846)			✓	
Nomisia Dalmas, 1921			✓	
Nomisia aussereri (L. Koch, 1872)			✓	
Nomisia exornata (C.L. Koch, 1839)			✓	
Poecilochroa Westring, 1874		✓		
Poecilochroa poonaensis (Tikader, 1982)	✓			
Poecilochroa senilis (O. P.-Cambridge, 1872)		✓		
Pterotricha simoni Dalmas, 1921				✓
Scotophaeus blackwalli (Thorell, 1871)		✓		
Scotophaeus validus (Lucas, 1846)		✓		
Zelotes flagellans (L. Koch, 1882)		✓		✓
Zelotes fuscorufus (Simon, 1878)		✓		
Zelotes pediculatoides Senglet, 2011				✓
Zelotes uronesae Melic, 2014				✓
LINYPHIIDAE Blackwall, 1859				
Canariphantes Wunderlich, 1992		✓		
Canariphantes tenerrimus (Simon, 1929)		✓		
Canariphantes zonatus (Simon, 1884)		✓		
Diplocephalus graecus (O. P.-Cambridge, 1873)		✓		
Erigone dentosa O. P.-Cambridge, 1894		✓		
Microctenonyx Dahl, 1886		✓		
Microctenonyx subitaneus (O. P. Cambridge, 1875)		✓		
Ostearius Hull, 1911			✓	
Ostearius melanopygius (O.P.-Cambridge, 1880)			✓	
Ouedia Bosmans & Abrous, 1992		✓		
Ouedia rufithorax (Simon, 1881)		✓		
Pelecopsis Simon, 1864			✓	
Pelecopsis bucephala (O. P.-Cambridge, 1875)			✓	
Pelecopsis inedita (O. P.-Cambridge, 1875)			✓	
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852)			✓	
LYCOSIDAE Sundevall, 1833				
Arctosa C. L. Koch, 1847			✓	
Arctosa perita (Latreille, 1799)			✓	
Hogna Simon, 1885			✓	
Hogna ferox (Lucas, 1838)		✓		
Hogna radiata (Latreille, 1817)			✓	
Pardosa C. L. Koch. 1847			✓	
Pardosa proxima (C.L. Koch, 1847)			✓	
Trabea Simon, 1876			✓	
MITURGIDAE Simon, 1886		✓		
Zora C. L. Koch, 1847		✓		
OECOBIIDAE Blackwall, 1862				
Oecobius maculatus Simon, 1870			✓	

TAXON	ES	CV	AL	*
OONOPIDAE Simon, 1890				
Oonops Templeton, 1835		✓		
Oonops pulcher Templeton, 1835		✓		
OXYOPIDAE Thorell, 1870				
Oxyopes mediterraneus Levy, 1999		✓		
PHILODROMIDAE Thorell, 1870				
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802)			✓	
Pulchellodromus pulchellus (Lucas, 1846)			✓	
Rhysodromus Schick, 1965		✓		
Rhysodromus histrio (Latreille, 1819)		✓		
Thanatus fabricii (Audouin, 1826)		✓		
Thanatus formicinus (Clerck, 1757)		✓		
Thanatus vulgaris Simon, 1870			✓	
PHOLCIDAE C. L. Koch, 1850				
Holocnemus caudatus (Dufour, 1820)			✓	
Holocnemus hispanicus Wiehle, 1933				✓
SALTICIDAE Blackwall, 1841				
Aelurillus aeruginosus (Simon, 1871)			✓	
Ballus C. L. Koch, 1850			✓	
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802)			✓	
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802)		✓		
Euophrys rufibarbis (Simon, 1868)		✓		
Leptorchestes Thorell, 1870		✓		
Leptorchestes mutilloides (Lucas, 1846)		✓		
Macaroeris Wunderlich, 1992			✓	
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802)			✓	
Menemerus taeniatus (L. Koch, 1867)		✓		
Pseudeuophrys nebrodensis Alicata & Cantarella, 2000		✓		
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837)			✓	
Thyene Simon, 1885			✓	
Thyene imperialis (Rossi, 1846)			✓	
SCYTODIDAE Blackwall, 1864				
Scytodes velutina Heineken & Lowe, 1832		✓		
SEGESTRIIDAE Simon, 1893			✓	
Segestria Latreille, 1804			✓	
Segestria pusiola Simon, 1882		✓		
THERIDIIDAE Sundevall, 1833				
Crustulina Menge, 1868		✓		
Crustulina scabripes Simon, 1881		✓		
Cryptachaea Archer, 1946		✓		
Cryptachaea amilcari **sp. n**.				✓
Dipoena Thorell, 1869			✓	
Dipoena melanogaster (C.L. Koch, 1837)			✓	
Lasaeola Simon, 1881			✓	
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802)			✓	
Ruborridion Wunderlich, 2011			✓	
Ruborridion musivum (Simon, 1873)			✓	
Sardinidion Wunderlich, 1995		✓		
Sardinidion blackwalli (O. P.-Cambridge, 1871)		✓		
Theridion Walckenaer, 1805			✓	
Theridion hannoniae Denis, 1945		✓		
Theridion mystaceum L. Koch, 1870			✓	
THOMISIDAE Sundevall, 1833				
Bassaniodes Pocock, 1903			✓	
Bassaniodes bliteus (Simon, 1875)			✓	
Bassaniodes bufo (Dufour, 1820)			✓	
Misumena Latreille, 1804		✓		
Misumena vatia (Clerck, 1757)		✓		
Xysticus nubilus Simon, 1875			✓	
ULOBORIDAE Thorell, 1869				
Uloborus plumipes Lucas, 1846			✓	
ZODARIIDAE Thorell, 1881				
Zodarion affine (Simon, 1870)				✓
Zodarion costablancae Bosmans, 1994				✓
Zodarion isabellinum (Simon, 1870)				✓